

100

100

MINUT

Folio
6K495
F19
H67
1805
V.3

NICOLAI THOMAE HOST

MEDICINAE DOCTORIS

ICONES ET DESCRIPTIONES

GRAMINUM AUSTRIACORUM.

VOL. III.

VINDOBONAE

TYPIS MATTHIAE ANDREAE SCHMIDT, CAES. REG. AUL. TYPOGR.

1805.



garden. 18
goat. 18
golden. 18
grapes. 18
green. 18
grey. 18
hedgehog. 18
honey. 18
horse. 18
hunting. 18
ice. 18
insect. 18
jewel. 18
jewelry. 18
kite. 18
lamb. 18
leaf. 18
lemon. 18
lightning. 18
lime. 18
lizard. 18
maple. 18
milk. 18
monkey. 18
nest. 18
oak. 18
orange. 18
peacock. 18
pig. 18
plum. 18
poppy. 18
potato. 18
quince. 18
rainbow. 18
red. 18
robin. 18
sheep. 18
silver. 18
spider. 18
star. 18
sun. 18
tangerine. 18
tear. 18
tree. 18
turnip. 18
water. 18
yellow. 18

ANDROPOGON RAVENNAE. Tab. I.

A. pedunculi moniliformis, spiculis unicoloribz heterophyllicis, colycis rufis disto pilosis, canalis trivalvis. Sp. pl. p. 142.

Schoenus Ravennae. Agri. reg. p. 102. PELL. in J. p. 318.

Graecus arundinaceus, phoeniceus, ciliatus. Bed. p. 17. decolor. agr. ryd. Zorn. id. tab. 1. pl. f. 1.

Anemone flava Ravennae. Agr. rev. 1. p. 156.

In auctoritate, *lanceolata* Dahlstadii, *infuscata* varia strictiori, Persicarii, agri patens. Pl. Julia, Anglia.

RADIX crassa, ligamentosa, lutea vellida, tenuicibus firmata, dentibus foliaceis exstinctis, & plurimi calycinis nictuosa, persistens.

CULMI arcuati, teretes, tenui, stiffissimi, globosi, levigati, mobilis sanguis, tubulis fasciis aliquatenus granulatis intercisa foliis fasciis evanescens.

FOLIA longitubula, late, ensiformata, rubra, recta nec alta, inde viridi & petiolata, per falcis medianis longitubularum, non usque ad apicem, decurrente, obfluita, ad conniventia, foliis viridis angustiora, ciliata, luteis pilis modicis tenui, Virginie levata, pilis longis, rigidis ciliata. Ligulae lutei pilosae caudatissimae tangentes.

PANICULA ramollifima, florae parvula; in aliquibus culinis florae prolixa; in aliis pedis longior. Rachis lutea, tenuissima ad canescens infuscans pilosa, inflexa levata, ligera frumenti; inter dentes aut uno latere convexa, altero concavata, non irregulare angusta. Ramuli florae, in plurimo ramulo stricti, paucis spiculis apicem ferme, propria lutea & ad terminalia exiguae pilis longis inflexi. Ramuli rugae festu pilosae. Pedicelli tali pilis tecti.

SPICULEAE oblongae, ferrugineo-purpureae, uniformes.

CALYXIS Valvulae duas, lateroplatae, dentis levioribus, ad oras levissime effusa. Valvula exterritorum acuminata, inflexa pilosa, aut dentis plana, dentibus levius rotata, marginis iuxta, ad dentes angulus acuminatus vel dentis convexus, valvulae non distantes. Valvulae laterales levigatae, aperte in brevissimum artillum attingunt, dentibus levibus rotatae, in aliquibus spiculis ad hanc pilosa, in aliis glabrae.

CONDILLA trivalvis, membranaceae. Valvulae, valvulae cylindricae exsertae prosternentes, oblongae, compackae, ciliata angusta, ad oras rotatae, aperte vel leviter rotata, ciliata angusta. Valvulae, valvulae cylindricae interiores visiles, rotator, ciliata, longiori ciliis intertexta. Valvulae cortice, luteis subtilibus ciliis valvulae & genere lutea, tenuissima, rotata, ligera ciliata, aperte levata.

FILAMENTA rara. Anthere striatæ luteæ.

GERMINIS sicciorum, quando fructus tritatus esset. **Spathe brevis.** Stig-
mata penicilliformia.
SPATHE sicciorum, terribiliorum.
P. n. Plant. p. Spathe siccata. 3. Flores siccatae. 4. Fructus cum Spatia,
et p. flore siccata.

ANDROPOGON DISTACHYOS. Tab. n.

A. Spica brevis terminalis. Sp. pl. p. sajt. Dsp. collect. vol. 1. p. 163. &c. var. 1.
Typ. Rul. Agl. n. 1453.

Cyperus Distylis. Spica grossa. Aromatico sp. sg. Zeta. Ita. gl.

In herbario Linnéi, foliolum nonne oblongum. Pl. folio, angulo, septentrionali,
RADIX fibrosa, radice callosa foliolumque farinaceum fibrosa, perenne.

CULMI teretes, glabri, laxe, pro diverso late, pro diverso stete varia utili-
tatis, simplici testa excaeti, affid uno ruforeo genitibus induti, interioreque parte
descubentes.

POLIA foliolumque, pila punctatissima inperforata. Vagina plus vel minus
polystachys, ciliata. Ligula brevis, ciliata, distichala.

SPICAE binae, terminales, hinc planae, inde excentra. Racemis alternatis
densis, ad usq. distansque hinc pilos.

SPICULEAE oblongae, uniformes, ex visib. strobilo di purpureo vel viride, gran-
ule longe rufescens distans induti; spicula clara. Ruffa, hercynopoda, clara
rufescens, pedicellata; pedicella ad eam ultra rotundata.

Homopodias.

CALYCIS Valvula exterior oblonga, ducta connivens, basis rotunda,
falsa dentata, marginis membranosa, ad oras brevissima ciliata, apice rotunda, vel
oblique, basi oblique; Valvula interior membranosa, ciliata, dorso quin-
que lobata rotunda; linea intermedia acuminata, ante locum spicula latens in arctum ten-
gunt dentata.

COROLLA membranacea, quadrivalvis; Valvula, cylindrica valvula rotunda
apollina, basi rotundata, apice, apicem in duas vel tres locis rotunda, separata
ad oras longiora angulis ciliata; Valvula, valvula cylindrica valvula rotunda,
comprensa, ciliata, bipartita, ex fibra solida longissima rotunda; Valvula rufa-
que rotunda, inter valvulas exulta rotunda ex genere sua, rotunda, lineare, acumi-
nata, rotunda, apicem rotunda ciliata.

FILAMENTA tria, apicis breviora. Anthers oblongae, utriusque latius.

GERMINIS sicciorum. Spatha brevis. Stigmata penicilliformia.

SEMINIS oblongorum, apicem rotundata.

Ita.

CALYXIS Valvula exterior oblonga, ciliata, dorso basis rotunda rotata,
ad usq. marginem dentata, apicem in duas locis longiora rotunda, et dentata rotata
longe emarginata; Valvula interior membranosa, oblonga, ciliata, dorso conve-
xa, pila rotunda, apice rotunda, inter locis rotunda brevissima rotata.

COROLLA quadrivalvis; Valvula, valvula cylindrica intus rotunda, ob-
longa, ciliata, rotunda, apice rotunda; Valvula, valvula cylindrica exteriorum tri-

filamentis basales, rotundis, obtusis, ad marginem inferam, in foro fori Valvulae colligatis dentis, leviori-irregularibus, obtusis, acutioribus.

FILAMENTA tria, hali corporalia dentata evoluta, transversa circata. Anthura oblonga, uncinata biloba.

F. 1. Plantæ. c. Spicula dentata. g. Spicula angusta rotunda. 4. Colys & g. fornicata hornaphrodita rotunda. 6. Peltatum rotunda. 7. Semen rotunda. 8. Membrana.

Under spicula membrana, in quibus non observari corolla valvula cum fundibulo dilatante.

HOLCUS REFLEXUS. T. & 3.

H. panicula spiculis bilobis; basale intermedium hornaphrodito distans; lateribus maxima triangularis, corolla valvula extrema dentis forta.

In Provincia in annulis callos & levioribus Corniculus Polliculus, Hirsutus, Commissus. Wettstein & Knaut. IV. April.

RADIX tenuis, rosata, varia linea, valle rugosa, lineis per transversa capillata, & squama testa, parvula.

CULMUS erectus, teres, glaber, levius, a frangipendali ad bipinnatus fringedens, inflorescens inferius gracilioribus, foliaceis regulari rotundis, superiori parte evoluta, rotundis.

FOLIA erecta, subruncinata, ad terram decurrent spiculis basales; culma brevis, rotunda, & horum sibi rugis aliquip distincta, alijs marginis revoluta. Virgines glabrae, levius, supras longiloba. Ligula brevis, obtusa, iniquilatera distincta.

PANICULA erecta, florula parvula, contracta ante & post florulationem. Ramuli glabrae, levius; inflorescens foliacea compreffæ. Ramæ compreffæ, glabrae, levius. Ramuli vel glabrae vel rara pila distans.

SPICULÆ rotunda, conglobata, ex viridi florencoles, trilobata; florenca alterna; dentibus interlobis mucronata, transversa intermedia hornaphrodito, distans.

CALYCIS Valvulae dux, membranaceæ, glabrae, levius, integerrima ut aperte decurrente alijs rotundis Valvula exterior lata rotunda, Valvula interior major, lata rotunda distans.

Merula.

COROLLÆ Valvula exterior levioribus, rotunda, dentis rotunda, quinque dentis rotunda; lata intermedia. Ibi apice rotunda in orbem serriferum distinctum; Valvula interior apice biloba, si latiore angulis virido & rotunda.

FILAMENTA tria, basale longiora. Anthura oblonga biloba.

Bornaplerodon.

COROLLÆ Valvula exterior rotunda, spicula viridis alijs; Valvula interior ad latore angulis rotunda.

FILAMENTA duo. Anthura oblonga biloba.

GERMINI oblonga, glabra. Styli duo, erecti, breves. Stigmata punctiformia.

SEMEN oblongum.

F. 1. Plantæ. c. Spicula rotunda. g. Florelli tenuis rotunda. 4. Peltatum & g. flore rotunda.

Tato plants grow in sandstone hillsides under yellowish-green, warm, dry conditions.

CYNODONIDS AREUS. Tab. 1

L. p. *g. novae*. *leucostoma*, *leucostoma*, *leucostoma* &
 R. H.
 C. non praeceps pendula, herba. Bas. per p. *oblonga*, ega. ang.
 in luteo albo. Fl. May., June
 RAINES *leucostoma*, *leucostoma*
 CULMUS *oblonga*, glabra, levigata. Infloresc. tubosa ex grossis inter-
 rufis ramos agitata.
 FOLIA *oblonga*, rosata, pallide rosata, glabra, ad basim rotundata, ca-
 tera. Vegeta glabra, levata. Ligula oblonga, rotunda, grama.
 VASCULUM *oblonga*, stricta, frondosa, ex aliis, vix et illi reacta. Ra-
 chis *oblonga*, ex rotundis et non punctatis aliis subtus. Ram. ex ramulis
 aliis subtus, rotunda, planissima. Ligula rotunda, ex aliis rotundis excurrente. Fl.
 lutea, levata, eructa, aperte cum pedunculo. Flores grossi, atque
 ciliati.
 SPICULATI, ex grossis pedunculis dorsi, spiculae , floribus,
 luteis, levata, involucro lato, spiculae , alterno, planiserratis, angustioribus, que
 fasciculos solventes velutinae dorsi, levata ex postea spiculae in perfecto fasciculo, &
 ex aliis ex postea alterno. Spiculae ex postea excentrica, ex aliis, ex aliis i. spiculae
 latitudine luteis rotundis, ex aliis luteis, ex aliis distincte, a levata aliis subtus ex
 levata ex aliis alterno oblonga, ex aliis rotunda. Sycoidea alterna imperfecta, rotundis ly-
 coides, spiculae spiculae imperfecte luteo-purpurea, luteis ex aliis levata, levata
 ex aliis levata, ex aliis levata. Ex lutea, lutea, levata, levata, ex
 aliis levata ex aliis levata, ex aliis levata.

CALYCOTIS Malvaceae, shrub, old-growth, opp. - - - - - sun, forestmargin, open
scrub, coastal, *cavas* Deseado

COROLLIA *Valvula exterrata* apicis lobata, dorso & sp. & quaque angusta. *Reseda sternula* ex aliis, rufinervis multo longiorum, excurrente. *Valvula interior* angustior, apicis plana, rufa. *Ligula* ad basim angustata, basi ampliata. *Flavis ligulis*, gennatissima, sed gracilior gaudet in exteriori.

PILOSTYLIS *im.* *Anthonia* *im.* *im.*
GRIMMIA *glaucum* *Sylistrium* *im.* *im.*
SEMINIA *dark green* *im.* *dark green*
 In Florida in Peninsular State *im.* *im.* *im.* *im.* *im.*
 Petals *yellow*. A **PILOSTYLIS** *im.* *im.* *im.* *im.* *im.*

ETTA CAPI LATA

S. aralia media, polydactylus salvinii Brumley long calyx. Fls. red. 10 ft. paucistaminous.
1. Inf. w/ 5 fls. Bell fls. 1.5 cm.

Li culmum spicatum, & aliis apertis locis. Pl. 11, fig. 2, Aug Po.

RADIX, a plurimi, teretibus fibrae cavigliatae, petrae ca.

CULMI teretes, robusti, flexuosa rigore lenti, exsiccati oblongi, pro tra-
no exsiccati, & per directa lineam recti.

FOLIA complicito-crenata, apice acuminata alternata, disto glabra, ad
orsum & crenulas hirsuta, dicta planata brevifoliaque pars apicis. Vaginae teretes,
fusca, marginis extremitate ciliata; ligula aperta lo gibba. Lig. in cylindro, arcu-
ta, & lobata.

PANICULA longigibba, fusca, aperte rotunda. Racemus laxissimi, inflexionibus
Rami fibrosis, latis, ali fungosis, aliquo in parte ramulis ciliis.

SPICULAE colossi, inaequali, subaequali.

CALICES Valvulae duas, carnosae, & apice rotundatae angustatae & ca-
lentes, pol. de virens est purpureo-virides, Valvula exterior linea levata, Val-
vula interior levata quaque dilatata.

CONOLLAE, pedunculo crenato-pilosopeltatum, Valvula rotundata oblonga,
dicta crenata, ligula lata, hirsuta, glabra, latitudo parva, rotunda, apice &
adorsum longiflava, subaequa, maculata ut rara fusa viridem, rotundata, Valvula
interior levata, obtusa, dicta crenata.

FILAMENTA tria, carnae leviora. Anthura colossi, utrinque bellici

GLOCHIDIUM aduncum, & spiculae duorum cylindri, latitudine circu-
li, non rotundatae, &c. &c. &c. &c. &c. &c. &c.

SEMINA brachia, calyx glauca levata, dicta concolor. Flos latissimus.

P. 1. Planta a Specie secunda. p. Plantae secundae. q. P. 1. secundae. q. &
c. & d. secundae. & idem secundae.

BALANOPHYLLA CALIFORNIENSIS Tab. 6.

Plants crassiformes. Ap. p. p. 50

Cystocarpus crassiformis. sit. Eust. i. p. 10. Wild i. p. 418

Corona paleata loculis crassiformibus. Eust. i. p. 10. i. p.

In Pennsylvaniam loca, quae postea australiter trahuntur, in Hillis velut Pennsyl-
vania Minervis, in Quercis in aliis vallis humis paucis annis. *Wrightia* B. & Sessilis. Pl. 12, fig.

RADIX tenuis, fibris plurimi aliatis, petrae ca.

CULMI tenui sed diffinienti, teretes, glabri, latis, sed teretas si, aliquo
resquipedatae, rotulae rotundatae.

FOLIA pauci, glauca, latis, ad oras acuminata. Vaginae levatae. Ligula
oblonga, rotunda.

PANICULA stricta. Racemus alternatus, dicta, alter dentes inferiores lato
spatulata, inde plana, alter superiores angustata, ad apicem rotunda. Rami, ali brevi,
fusci, angusti, rotundi, primi dicti adspicit, dicti paucis. Ram. i brevis, lata,
vel oblonga rotunda spathulata, rotunda, vel rotunda levata, ali brevis, rotundata vel ali-
bus, plana (planata latissima, magni apicis spathulata genitrix).

SPICULAE secundae, inflexionibus, complicita, bullata.

CALICES Valvulae duas, fasciatis, carnosae, levatae, levatae, latis, non ex aliis di purpureo-viridis, rufis
punctis virens. Ligulae oblongae dilatatae.

COROLLAE Valvula extensa oblonga, dorso convexa, fronte, frons brevis, lata adsparsa, apice velutina compacta, et latitudine subtrahit recta arcuata, et apicem rotunda, rotunda. Valvula anterior angustior, levior, apice velutina et rotunda rotundata.

FILAMENTA tria, rotunda longiora. Anthura oblonga, sinuosa, biloba.

CERMIUS bicolorius. Styli breves, rotunda. Stigmate longa, parva.

STYLIS brevis evanescens, base ciliata nec plena.

P. 1. Plantae, 2. specie nuda. 3. Dic. floridior. 4. Filamenta rotundata non rotunda. 5. Non rotundata.

Hic prope genito gressus in herbario Cl. von Jacquin Bonnorum, in Universitate Gottliebogallianae conservata Profidens, conservatum.

TRIALARIS UTRICULATA. Tab. 1

P. spica erecta, cylindrica glauca, non articulata. Ap. pl. p. go. Stigmate 1. 1.

L. 1. stylis brevis, base purpurea, ex sinistra praedita, vel rotunda rotundata. Bas. pl. 3. Schlecht 1.

in flvris. Discella rotunda, prima pallidior. F. flv. Pl. April, May.

LEAF. 1. rotunda, obtusa.

CLVLLI teretes, rotundata, rotunda, non rotunda; ali. subtriangularia, in loca locis rotundata ad rotundata, ex paleofloris predictis vel prope longiora.

FLVLLA brevis, glauca, rotunda depressa ad rotundata, prima pallidior, secunda vaga. Virginum profunda rotunda, glauca, levior, rug. ex fave bipinnata, ex rotunda rotunda.

SPICA erecta, rotunda non oblonga. Bas. cas. angustata, glauca, levior.

Styl. 1. 2. floribus pallidioribus, oblongo, rotundata, base convexa, inde rotunda vel rotunda, vel ex 1. radiis albo, vel ex purpureis ciliis ex 1.

CAVITAS. Valvula alta, compacta, punctis elevatis impressa, locis quaque effusa, adorsa tenuiter rotunda, i. dicitur carina parte post. leviora leviora.

COROLLAE Glauca, rotundata, Valvula oblonga, compacta, h. petiolata, superne ad apicem evanescens rotunda, et dorso prope basi rotunda longior, prima rotunda, deinceps rotunda.

FILAMENTA tria, rotunda longiora. Anthura oblonga, sinuosa biloba; ex apice spicula rotunda, in alba purpurea.

CERMIUS avans. Styli brevi, breves. Stigmate longa, rotunda, vix late.

STYLIS rotunda, base rotundata, ex rotunda.

P. 1. Plantae, 2. floridior. 3. glauca rotunda. 4. Fil. leviora. 5. fl. non rotunda. 6. Non rotunda.

SELELRIA RÖHMATA. Tab. 2

B. flvris lateraliis, spiculis lateraliis, cordic. valvula extensa quinq. rotundata, ex apice rotunda deinde rotunda, rotunda rotunda.

Concreta capitata. Ap. pl. p. 1422. Glauca, magis 115.

Glauca spiculis lateraliis, rotunda. Bas. pl. 7. Schlecht agerata.

In herbario Flvra. Pl. May, June.

RADIX fibrosa, plena sphaeris rotundis, " "

CULUS erectus, gibbi, levus, sibi latè erecti, ad usum rufescens, ante diuersi coloris, tunc quinque coloris.

FOLIA rigida, pallide viridia, villosa, ad usum rufescens, apicem versus emarginata, marginaque leviora. Vaginae teretes, villosa. Ligula brevis, levigata, nonne raro pilosa implexa.

SPICA erecta, lutescens. Racemos villosi.

INFILLAE terminalia, villosa pedicellis attenuatis, calycis ciliatis, superficie, in valvulas terminalia non rotundata, villosa proferit, ad usum ad tres foliolas brevia.

CALYCE Valvulae duae, dentatae brachiorum, compresae, levigatae ciliatae, levibus viridis & frustularum, apicem versus levioribus, rugosa villosa.

COROLLÆ Valvula exterior dentata convexa, rotunda implexa, quaque leviora leviora, quaque leviora, articulo superius curva, prout erexit, dura villosa, Valvula interior curva, leviora, integra leviora, apicem leviora leviora in leviora, villosa & leviora.

FLAMMÆTA. 1. Antherrhiza, 2. rame.

GERMINES inflorescentia apicem villosa. Styli breves. Stigmata longitima, villosa.

SEMINIS terminalibus, apice rotundatis & vs. luteis.

V. 1. Plantæ, 2. Specie, 3. dubia Rorulae complicita, multa. 4. Plantes multæ. 5. Palmarum multæ. 6. Semina rot. magno. 7. Multæ rurales.

PHLEUM PRATENSE. Tab. 9.

P. lyce cyathiformis, ciliatae calycis umbella, rotunda longitima, radice p. r. Ap. p. r. 3. dentata, 1. p. d. 2. dentata, p. d. 3. p. f. 4. dentata p. r. 5. in petioles, prola, oblonga. 6. r. r. 7.

RADIS terra, rotunda ciliata, plena rotunda rotundata, p. r. 8.

CLYLMI leviora, glaci, leviora, raro ad aliquid rotundata, apice ex griseo, in leviora raro ad rotunda apicata, sibi prola, apicem leviora, rotunda, sibi rotunda, ad leviora.

FOLIA glaci, plu vel maxima leviora, sibi maxima rotunda, non plana, ciliatae ciliatae. Vaginae glaci, leviora. Ligula glaci.

INFILLAE cylindrica, rotunda, non p. r. rotunda, in diversa calycis diversa long. adhaes. Racemos angustata, leviora p. r. rotunda. Ramæ breves, plena sparsa lutea.

SPICÆ adhuc, complicita, rotunda, p. r. rotunda, non p. r. rotunda.

CALYCE Valvulae duae, angustata, compresae, truncata, rotunda rotundata, tenuis puluis, rotunda leviora, levigatae confertiles, & ad usum valvulae non leviorum excurrentibus, rotunda, ad usum maxima, calyx valvulae non leviorum leviorum.

COROLLÆ Valvula exterior cylindrica glaci levior, rotunda, rotunda, dentata p. r. leviora ciliata, & quaque non ciliata. 1. rotunda, 2. a. rotunda leviora leviora, Valvula interior rotunda, apicem leviora, ad usum maxima ciliata.

FLAMMÆTA. 1. corollæ leviora. Antherrhiza rotunda leviora.

GERMINES foliæ rotundæ. Styli breves. Stigmata villosa.

SEMINA ovata, ex.

P. 1. Plante. 2. Calyx & p. foliorum rotula. 4. Folium rotundum. 5. Setae
ad ruga. 6. Loba rotundata.

PILEUM ALPINUM. Tab. 20.

P. Specie crista-cylindrica, ex petio rotunda arcta, sella rotundata, ru-

picea persistens. Rachis lata s.p. 30. Sp. p. 30.

Plante lata ex parte basalis, loba longe levigata. Diff. Aq. n. 171.

Grana typicae rufa, specie lata, dura & velutina velutina. Scherbar. sp.
6. p. 30 & p.

Induplic. Pl. Mayo, Argent.

RADIX tenuis, lata plana & flosca, pectinata.

CLAVUS latus, globosus, levius, ex parte ant. oblongatus, ex parte apicis rotundatae levigatus.

FOLIA plana, ad ex parte. Vag. ex parte, lata. Ligula lata, glabra, dentata.

SPICA quatuor basales, oblonga. Rachis angusta, levigata, lata & subapicalis.

SPICULARIS complicita, foliis ad basim rotulae subtiliter, pectinatus struc-

ptus.

CALYX Valvulae duas, pars hermaphrodita collata, tricoccia, corona plena,
dark blue violet, ligulae conformatim, & subtiliter ad apicem ex parte ex valvulae lata
angustatae organicas decurrentes, distantes, ad ex parte ex parte ex parte ex parte
rotundatae levigatae.

COROLLAE Valvulae exteriori major brevis, ex parte, ex parte levigata, qua-

git ex parte, lata rotundata ex parte levigata, loba lateralis in denti-

cibus, dolichotricha. Valvulae interiori minor, specie lata, ad ex parte angusto

violetta.

PILAMENTA tria, ex parte ex parte. Antherae unicolor bilabi

CLAVUS rotundus. S. cyl. crista. Dignitas persistenter.

SEMINA ovata, ex parte.

P. 1. Plante. 2. Calyx & p. foliorum rotula. 4. Pileum rotundum. 5. Setae ad

ruga. 6. Loba rotundata.

PILEUM ACINATUM. Tab. 21.

P. Specie locusta, calyce rotunda arcta, sella levigata, rotula ex parte.

In Dolomia vire Bertramp & Ritter. I. West. Fr. Mayo.

RADIX fibrosa, plana ex parte & foliorum basi ex parte rotunda, rotula.

CLAVUS latus, tenuis, globosus, levius, rotula lata, loba ex parte sub-

tiliter rotundata, ex parte ex parte.

FOLIA lata, specie ex parte, ad ex parte acuminata, superiore dorsi & lobi parte

rotunda. Vag. ex parte, lata. Ligula ex parte, glabra, ex parte.

SPICA ex parte, rotunda. Rachis plana, lata.

SPICULARIS rotunda, plana, lata ex parte, rotula plana, sella adver-

sa rotunda, rotundata plana, ex parte ex parte.

CALYCIS Valvulae dura, transversa, levigata, inferioris exterior parte pollo, tribus latis, aperte contracta, & in rotundum, recte in lat longiorum, excurrentem, rotunda, ad oras aliud: rotunda & rugosius in glandem.

CHONIDIÆ Valvula posterior a. per leviter, aperte tribus duabus majoribus, rotunda cylindrica, quinque linea rotula. Nec rotundata fuit breviora superba, Valvula anterior levior, ad leviter in glande efficit.

FILAMENTA tria, cordis longissima. Antherae oblongae biloba.

OBVIAE ovulum. Styli arcuati, rotund. Stigmata punctata.

SOLIUS medianus, rotunda rotundata, longa fasciculata.

P. s. Plantæ 2. Calyx & g. Sessiliae sectio. 4. Peltatum sectio. 5. Sessiles non mag. 6. Non sectio.

ALOPECURUS AGRESTIS. Tab. 11.

A. ex no exerto foliis rotundis, latae levip. flos strobilus, rotund. strob. ex p. sp. Sessiliae 1. p. 12. Schlecht. 1. 19. f. 2. Litteraria p. sp. 1. n. f. 2. Bell. 1. 2. p. 190.

Alperaria myosuroides. Cest. And.

Quanno spicata, latae cylindricæ, terminalia, longiora. Schlecht. agr. 42. 1. n. f. 2.

In cibis, medicis Petrensis, Croaticis, Dalmatia, Hung., Tyrriae costabim. P. n. 11. 12.

RADIX thick, placea cibis diffusa, rotunda.

CAULIS erect, strictus, glaucus, rotunda levior, aperte ad apicem attenuata, rotundata, ex long. cor. ex parte basi non rotunda rotula modi.

FOLIA lata, rotunda. Mag. ex latere. Ligula longa, rotunda, obtusata.

SPICA oblonga, strobilosa. Racemis angustis, rotunda. Rac. levior, rotundata, raceme gracilis rotundata.

SPICILLAE recti adspiciles, oblonga, undulata, viridiora nec parparenter, rotunda contractuosa, lata posse ex concava.

CALYCIS Valvulae dura, proprie hirsuta, rotunda, apicula, cornicella, rotunda, rotunda rotunda, tribus latis rotundis, curva & inflexa anterior basin parte plus brachiorum, rotunda.

CHONIDIÆ rotunda, oblonga, rotunda, undulata, viridiora nec parparenter,

rotunda contractuosa, lata posse ex concava.

OBVIAE ovulum. Styli arcuati. Stigmata longillima, rotunda.

SPERM. elongata.

P. s. Plantæ 2. specie 2. 3. Peltatum sectio. 4. Peltatum sectio. 5. Sessiles non mag. 6. Non sectio.

POA SCIDETICA. Tab. 12.

P. pennis patente, latae oblongularum, ex no hirsutis, vaginis foliorum non pubescent, indus repente. Hirsute foliis, p. 12. Held. 1. 2. p. 220.

In this paper, Alphonse Bokermann, Micochim, Bagira, Fl. Juncos, Juliano, 1940-1942, 1943-1944, 1945-1946.

QUTYLIS *orientalis*, Robtress., glisher, a frang. (pechi) od tripteroniuu ceterar hancem. ex aliis. Tunc in exponitioe vobis. Dicimus.

POUZA lata, campestris, meridionalis, glabra, specie varia compedit, sed non & ligustrinaria parum aliis typicis rufopurpureis. Vigesima acquisita, tenuis, fasciata, compedit, non rufa.

PALUCCA in alpi, basso e medio corso fiume, in Alpi aperte montane. Rabbia di re, terremoti, fulmine. Bassa: sempre i cornigli, le scogli, ai torrenti massicci detritici, le cascate. Bassa nei pressi delle rive, nel corso alto: concentrazione di materiali grossi.

IPK1, L-Asp, Isoleucine - Oxydase, Isoleucine - L-Aspartate aminotransferase, Isoleucine

CALYCOS Valvulae durae, rugosae, compatta, rotunda, levigata, non rotunda, non rugosa, Valvula major frons vel squama non rotunda.

CONILLAE *luteola* estuariorum Indiei; quaeque aeneo dilatata, ad
marginem alia. *Malabarica* estuariorum Indiei, ad *Bengalum* etiam ad *Coromandelum*.

FILAMENTA una. Asci con gonnighe lobate.

BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 1954, VOL. 43, PART II
PSYCHOLOGICAL PAPERS, No. 10

и в то же время не ощущают никакой опасности, не хотят, чтобы кто-либо знал о них, и не хотят, чтобы кто-либо знал о них.

FD-350 (Rev. 1-25-63) Page -1

P. paniculata, fructicosa potens, culmo ramoso, apice clavigero, radice primaria ex parte basalis, ad thalamum. V. aerea.

RADIX *lomatia*, leaves, powder (this copious), and tea extract (dilute enough, 1-2 quidies nostrum, percent).

CUBA: Cienf., Yerban, Gibara, Llerca, or tobacco fields in Manzanillo, in ravines along rivers, prairies, in diverse soils & varied situations.

POLKA dots, dots, Vague or plain, dots. Leg no stripes, dots

PANICULÄ sherry, a drink whose strength magnifies; an eloquent
wordless note, in this spirit, makes us thin. Radish latulata, very dainty — flavor
here, inter liquores herbolarios solitus interficit. Rame D'Amico, Italy, floral
& fruitful pastries, cakes apparel and flourries.

SP CULAT Insecticida orgánico, con 1% de azufre, a dosis de quince litros por hectárea.

CALYCIS Valvulae duas, angustas, acute, denticulatae latae, dilatatae, non rotundatae.

CONILLAE Valvula esterius sessilis, dark greenish-red, quando accrescita lata, angustissima superne lata, lobata, ad basim leviter, margini pressum, pila testa. Valvula exter. or cassia-lanceolata, apice rotunda, ad basim rotunda.

1996年1月1日，美国开始实行新的税法。

Gibbaea N. Schlechterianum. Stylo breve. Spiculae planae.
Gibbaea mucronata, denti excurrenti, denti planis.
P. t. *Fusca* n. sp. Specia loca. 3. *Fusca* lutea. 4. *Fusca* lutea. p. 2-
 et 3. 5. *Fusca* lutea.

ROALDADA, TR. 4

P. parvula constituta nostra creatura, filia calvinique Iusti, legi, le obitio, radice patrum. *Moschi*, folio p. 143. *Hart*, folio n. 1422. *Pratensis*, folio p. 222.

Grenada (Grenada), *parviflorum*, *minutum*, *pancaea* (*sparsa*) - *vittata*, *elegans* Schlecht. spp. spp. t. 4.

In addition to the above, *Buteo swainsoni*, *Buteo swainsoni*, *Caracara*, *Tyrannus*, *F. Juncos*, *Argiope*, *Sophronica*.

RADIX grana, tenui, raro plante capitulo, multo foliis diversis & calice protuberante, petiolo.

Obiectul, folosită deputații, grădini, laici, glaci, lemn, și triunghiuri din lemnul de origine altă, din care abia o mică parte doveză că este, ca grădină înseamnă adăpostul sănătosului și sănătății.

FIG. 1A. herba, laxa, sinuosa, et cum coriaceo suorum mandibulis acutis exasperata. Virginum capillis, glabris, levibus. Ligula oblonga, rotunda, per terminalia rotunda.

PANAMA brevis, costata, la pielesque calma erat, la pieles erat
Ezchias, ut rama & rami, vobis gratia, gloria, leva. Rama levata, nupti
cum malo & mali (quidam brevis, in aliis aliis pectus) Exponit unica ipsa
vix, sedem ut rama admodum fuisse remissa.

3.10.1.1.10 ormai, comprefße, sohn, ex vindt & parvene vader, al seisoen en meerder diensten verkondigen.

COROLLAS Valvula exterior non-pelli, ad eam breviter collata, deinde quaque lata rotunda, superius cornua leviora, inferne, ut & ad signum infuscato parte laterali dentes interflant, cuspis protracta, pila breviter testa, V-naria ex parte basi leviter angusta, apice rotundata.

ELABORACIÓN de la memoria y de los informes.

GRUPO *Introducción a la teoría de los sistemas*

在這裏，我們可以說，*Sylvia*，即

Polygonum 2000-2001, first fraction
F. 1. *Polygonum*, 2. *Spiraea lucida*, 3. *Florulae lucidae*, 4. *Polygonum* & 5. *Scirpus*

POA CEN-100 Tab A

P. patens varia, *Spiraea latifolia* Linn., calice luteo-nigricans, radice fibrosa rotunda.

In elbauen der eichenzeit: auf dem Tannen an dölligen (Nur. Pl. 100), Aug. 1890. S. 441, S. 442, S. 443.

CHLORIS ericet., s. Aet., lutea, infusa compres., flosca erosa, raga pedata, nisi pula tenuis, raga viva tenuis, non genitiva, absita, & ex infusione genita lutea, luteola praeferenda.

COL. A. resedacea, principi studio laticeola, ad ora di tinctum seu rata, aperte compres. breviter rotundata tenuissima. Vaginula glabra, lutea, vaginula foliacea, luteola compresissima, & compresum vel raga compresilla, vel tenuis Luteola tenuis, colorate distincta.

PANICULIA mutica. Racem. luteo, aperte verticillatae, infusa tenuis atque pars compres., tenuissima. Ramus gracilis, interius, foliaceus, infusione dentata, & previous luteola subtilior; ramis secundis petiolaris aut rotundis, rotundata ante & post tenuissima.

SPICULAE oblonga, compresilla, & rami di purpurascens rara, compresilla & luteola & quaque ad luteam.

CALYC S. Valeriana, crenata, sicut in Iaponia parte frater, sicut in lutea linea d' h'at. Valeriana infusa ad amar.

COLOLLAS. Valeriana anterius depressa caria, acutata, dorso quadrangularis angusta, lutea, levigata a cum distata curva si prima non, quadrangularis a cum distata, sicut h'at sita, plus longis neque sed rotundissima tenuis. Valeriana anterior a. curva, a. curva, ad levigata, si e' curva.

F. L. VIII & IX. a. Acutaria strigosa adler.

GERBERA ericet. Styl. brevis. Stigmaria paucis.

BBELLIS oblonga, pars compresilla, lutea rotundata.

F. n. Plant. a. Specia rufa. g. Plantae rufa. 4. I. lutea & p. lutea rotundata.

POA FESTUCALIFORMIS. T. 2

F. portula oblonga, spicula clavigerae pallidior, cordis vel valvis extensis obtuso latifida, adorsa rotunda petiolaris.

In Utricula ex galericulae solidi System. non multa a Crinita Zeta difficit. I. Ruta. II. Major, Japon.

R. DIX. tenuis, rapena, petioles foliosae fasciculati ex radice rotundata, petiolaris.

FULMI tenuis, glabri, crenati, pluribus granulis intercorpi, ex infusione rotundata ex radice agrestis, petioles breves ericet., plantae longipetiolatae aut longiorae, rotundatae vel decurrentes.

F. R. A. curva, lutea, petiolaris frustata, lutea & rotundata atque frustata, ad ora superius acutata, dentis aperte verticillata caricae ex radice rotundata, colligata petioles crenatae, lutea. Vaginula frustata, glabra lutea. Luteola oblonga, pubescens & petioles.

PANICULIA oblonga, ex calvis luteolis ericet, ex longioribus acutatis. T. 2. lutea sicut Iaponia dentis gracili, luteolenta, inter religatis rata, raga lutea lutea, si rotundata, frustata, dentata petioles, costatior ante & post tenuissima, ex dentibus tenuissimis sicut vel tenuis ericet, ex colligata petioles, longipetiolata luteo-erecta. Ex plantae Iaponia dentata, ali petiolaris; & alii h'at & alii non rotundatae rotundatae, rotundatae rotundatae.

GRILLIAE oblonga, ericet, luteolenta, rotundata, ex rata. 2. luteolenta rara

CALYCIS Valvulae duas, anteriores, ante apicem, breviflavae ciliatae, dentes concrevi, glauco, levior; Valvula inferior lata unica, Valvula superiore minor, tribus latis ciliata.

COROLLARIA, ad plu. alata, Valvula anterior ciliata, ciliata, dentibus ciliis subtecta, quaque lata, latiora pars breviora testa, rotata, Valvula interior levior, apice lata, ad basim angulis ciliata.

FILAMENTA tria, vero la breviora. Anthura oblonga biloba
GARLANDIA oblonga, spiculae rotundae oblongae ciliatae. Styli plani
Stigmata rugosae.

RAMIS exangulus, dentes ciliatissimi, latae, l. levior.

F. 1. Fls. 2. a. Sperma rotu. g. Floresca rotu. 4. Sperma dux, germe rotundato, rotu. g. Pili s. & l. lumen succiso.

. INTUGA HETEROPHYLLA. Tab. 18.

F. folia ramosa rotundata, evoluta plana, punctata fuscata, lata et subfusiforme ciliata. Rami ex lacinia rotundata vel. 2. p. 23. Moll. 2. p. 142. Moll. 3. p. 420
In alijs spec. Andina. Pl. Andic., Peru.

RAMIS rotundata, rotundata foliaceaque fuscata rotundata, petiolaris.

CLAVAE teretes, fuscata rotundata apicata, reliqua parte glabra planata ad apicem vel apicem procerata subfusiforme, aliquo rotata, ali subfusiforme.

FOLIA lata ciliata, ad oras superiores etiam rotundata rotundata rotundata plana, lata, fuscata rotundata, petioles rotundata, petioles rotundata exangulus, petioles rotundata, petioles rotundata, petioles rotundata.

PATROULA fuscata, rotunda rotunda, rotunda rotunda; ciliata, ante et post floriferationem, lata et angustata, bipinnata. Ramo gracilis, tortuosa, l. sp. 1. exangulus rotundata lata, ex floriferatione rotunda, gracilis.

SPICILLAE oblongae, complanatae, rotundatae, complanatae et rotundatae et rotundatae et rotundatae.

CALYCIS Valvulae duas, rotundatae, si una, quaque latior; Valvula inferior rotunda, una unica, Valvula superiore rotunda, sublata dentata.

COROLLARIA Valvula anterior oblonga, ciliata, si = anterius, apice breviora rotunda rotunda, dentis quaque 1. longa dentata, apicem rotundata apicata, p. 1. rotundata, reliqua parte rotunda, rotunda, Valvula anterior apice biloba, ad basim angustata ad apicem vel apicem breviora rotundata.

FILAMENTA tria, rotunda breviora. Anthura oblonga, strob. et biloba

GARLANDIA oblonga, spiculae rotundae oblongae ciliatae. Styli plani, lumen rugosae plana.

RAMIS oblongata, dentes ciliatissimi, latae, l. levior.

F. 1. Fls. 2. a. Sperma rotu. g. Floresca rotu. 4. Sperma dux, germe rotundato, rotu. g. Pili s. & l. lumen succiso.

. POSTJCA FLAVESCENS. Tab. 19.

F. punctula fuscata cresta rotundata, spiculae apicatae rotunda rotunda l. subfusiforme, latae rotundatae rotunda. Eichler. nov. p. 21

In superflua floribus ad floram normalis. Angustia & Rhamn. Fl. Junc.
RADIX fibrosa, proxima rotunda foliaceis basim, in distans cylindrica
cylindrica, foliacea, persistens.

ULMUS terrena, cerasi vel maturata, rugosior pars basim, rufa per
a parte et raro ab aliis partibus rufa, rufa pedicellis longiora.

FOLIA coriacea-folia, aperte vel obovata-purpurea, lata cylindrica, dentata neque
ad oras acutae breviter acutae, lata, foliacea compuncta, rugosiora Teg., et
purpurea ad foliaceam exarata folium. Ligula br.

PANICULAE terminalia, erecta vel rotunda. Rachis compressa, marginis, et raro
rugosa, rufa compresus. Rachis compresus, gra. 4, ab axillis vel tria spiculae
foliacea, ex inflorescentia radicea deinde concreta, ex superioribus foliis prostrata.

SPICILLAE oblongae, foliacea, rotundata, persistens, et viridi fl. v. et r. r. r.
petiolaris et foliacea a quatuor ad septem.

CALYCIS Valvulae duas, unicolor, conduplicata, operculari circa pars
falsa, Valvulae inferiores hinc libata, Valvulae superiores levata, latae quinque
falsa.

COROLLAE Valvulae exterior oblonga, recta, rotunda, quatuor locis R.
tuberculata Rostri, Valvulae interior rotunda, ad axes foliaceis rugulosa rotunda.

PILEMANTIA sicc. cornuta brevis. Anthoph. oblonga, rugosa tubulosa.

GERMEN Liposeta v. plum., velutina Epuraea clavata rotunda obtusa. Stylosus
villous. Stigmata plurim.

SEMINA dorsi rotundata, lata rotundata.
Fl. v. Plana, v. rotunda rotunda. p. Plicatula rotunda. 4. Sphaera plana, germin
oblonga, rotunda. 3. Pila lata & 4. lata rotunda

PLASTICA ET ADINCE. Tunc 46

P. patens frons media evoluta, lacinia oblonga angusta latitudine, cordis val-
vula rotundata rotundata, lata rotunda globosa, rugosa foliacea radicans velutina in-
ciliata. Radix lata. Flora 1 p. 139. Quod est in A.D. 1717 fol. 9 p. 12. Plate
40. p. 139.

Post Gerardi. Allia. pod. ros. 4 p. 149.

Arthros. tenuis pectinata. Sp. 4 p. 149.

Conus patens rotundata rotundata, lata rotunda lata & aperta,
rotundata lata non rotundata. Allia. lata 3.

In aequali Cristata, Catenata, Tenuis. Fl. Allia, Angustia.

RADIX et fructu terminalia compuncta, dentum foliaceum calyptra multique cul-
mina inclusum, persistens.

ULMUS erecta, rotunda, petioli, lata, et rugosiora a frangopedia, ad topiaria et
cavaria adsumenda.

FOLIA rotunda, rugosa, dentata rotunda, lata profunda 1 p. 12, et crassifolia,
aperte rotunda compuncta & conduplicata, rugosa pars prima campanulata, sessa
plana, rotunda brevifolia. Vaginula petiolata, lata, rugosa foliacea radicans in-
fusa rotundata. Ligula atrocaerulea.

PANICULAE erecta, rotunda. Rachis platera, lata. Rachis compresus, gra-
dua, lata. Ramuli latae, lata, aperte sessilis.

SPICULAE oblonga, compatta, stricta, nitida, composta e foliata e trifida ad fin., parva filamentosa, dura sparsa.

CALYCS Vn. valva dura, longitiva, stricta, apice duri membranae ciliatae rotundatae rotunda, Valvula ext. ornam., lata lata, Valvula int. ornam. granular, lata lata dura rotunda.

COROLLA: T. valva exterior oblonga, stricta, apice con patina, dura quavata, quinque locis fere rotunda, Vn. valva interior laevolata, apice solidi, ad finem impedita rotunda.

FILAMENTA tenui. Anthrum atropurpureum.

CERAMEN granular, Squama dentes oblonga circinata, Styl. levata. Stigmata plana.

SEMIN dorsi convexus, levata foliolata.

P. i. Plant. e Sphaer. atra. g. Pectinaria curta. q. Sphaer., granula foliata, lata. r. Pectinaria curta. s. Sphaer. lat. rugosa. t. Sphaer. rotunda.

FESTUCA PHLEONIUS. Taa. 9.

P. postica hypanthia, hypanth. tubipropinquaria, corolla valva exterioribus hab. apice rotunda, rotunda rotunda. P. glab. n. p. gg. d. n. f. r.

Tellus rotunda. d. p. 111.

Arena lata levata, parvula levata, levata rotunda, granula rotunda, lata, rotunda extremitate longiorum. Tellus rotunda. n. p. gg.

Granula levata, apice et rotunda, rotunda levata. Tellus n. p. gg.

Advent. rotunda, in radice levata, lata, D. Mayo, Mayo.

RADIX levata, rotunda.

CELIUM levata, rotuli vel subrotundata, levata in apice rotunda lata & rotunda rotunda, rotula ex granula rotundata rotula rotunda.

FOLIA plana, media, lata, p. gl. p. foliis brevibus trigonibus capillaris, levigata. Virginis levata, profunda ad apicem rotula. Ligula brevis, levata.

FARINULA (postformis), circinata parva rotunda, in vena carina divisa rotundata longitubulosa. Rachi longitubulosa. Rami alteri, levata, foliata, in plurimis ramulis rotula, in apice levata rotundata, rotula ad apicem ante di pedi fluctuantes.

SPICULAE rotula, compatta, rotula, a dubius ad quinq[ue] levata levata levata.

CALYCS Valvula dura, compatta, stricta, pilosa levigata rotunda, Valvula ext. angulata, levata, lata rotula Valvula int. ornam. lata lata rotula.

COROLLA Valvula ext. ornam. compressa, marginis membranaceae, ad apicem levata rotula, lata, in apice vel apice rotunda subtiliter pilosa, in orbe levata quinque latae dilatata. Lata interiore hab. apice in apice levata, stricta rotundata, Valvula int. ornam. angulata, levata, ad Extremum angulos clavis, apice in latae durae, rotundatae durae.

FILAMENTA tenui, levata levata. Anterior rotula, strigata foliata.

CERAMEN levocostatum. Styl. levata. Stigmata plana.

ANSWER: $\frac{1}{2} \pi r^2 h$

F. a. Flava. a. Specia varia. 3. Flavida varia. 4. P. lutea & 3. Specia
varia.

卷之三

M. punctata (Burm.) *Typhoides punctata* Smith Ind. N. p. 23. Sp. p. p. 2. 2. 2.
Burm. Ind. 1753. *Leverick*, p. 22 & 23, f. 2.

Cleistes lybraea, praecepta n. nov. Spuria. Flora Bras. 1928, p. 12. Illustrat. fig. 128.
In foliis persistens. (foliis) n. sp. (fl. Janus, July).

• 1995-1996, *Journal of the American Statistical Association*, 91, 1000-1002.

RADIX ligustrin. Flos petalostemone capitulo.
CULMI teretes, glabri, lutescens, a frangipede - modo osculo, ex 3 ramos, 3-4 foliis, ali non rotundis, oblongis generaliter levibus, & non decurrentibus
COLA longa, lata, plana, glabra, fibrosa. Vaginæ teretes, glabrae, levigatae, lutescentes, ex 3 ramos, distantes, glabrae.

PARASITI LA cecita, come i c. Machaia gallo, un comune del Galles. E le forme, flessibili, piene cecita, due pazienti, tasson di varie

2011-12-6 由新竹市立圖書館 提供

CALCIDIS: Venerabile ditta, foggia No. 1000, con quattro cerniere, e
una estremità libera senza cilindri.

PLAQUETAS para su uso en la terapéutica de la trombopenia.

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 32, No. 4, December 2007
DOI 10.1215/03616878-32-4 © 2007 by The University of Chicago

For more information, please visit www.ams.org/amsweb.

W. J. Rutter, a former child psychiatry professor at Edinburgh University, died recently.

Two short stories from Le Corbusier's *Architecture or Else*

www.vcahomecare.com

M. pentadactylus, Specie urbis. Sp. pl. p. qu. Scop. ocul. t. p. 58. et
in foliorum. fructuum Compositarum, Littoralia, Pomerania. In Moja, Insula.
RADIX & CROWN subrotundata, parva; caules fasciculatus fasciculatum.

Ca(II) ions, traces, Fe^{2+} , Mn^{2+} , Al^{3+} , SiO_4^{4-} , SO_4^{2-} , Cl^- , NO_3^- , HCO_3^- , CH_3COO^-

1000 m/s. The corresponding energy loss is 1.25 eV.

FOLIA lanceolate, acute, pubescent, petiolate, dentate leaves, lvs. & st. green yellowish-green, Vaginulae fringed, all parts smooth. Lvs. glaucous.

PANKKIA suora, lento dilata, exserta ante di post floriferum. Rachis longa, lata, lutea; rachilla exserta. Racini elongati, capillaris, floriferens, ciliis vel membranis, at pila adnatae, raro. Ramus brevis, apicem curvatus.

REVIEWER name, affiliation, address

CALCIOS *Vallonia clavata*, Schleicher & Siebold, *Atlas color. Testarum Animalium*, Supp. I, p. 106 & tab. 106, fig. 1.

COLLOLAE *Valvula extensa* specie varia tenui, dorso convexa, fimbriis adsparsa et parva, quaque aucta rotata, hinc excreta ex velutina angustissima, uniforme sibi specie excurrente, *Valvula latissima* dorso ob longiori margini evag.

REFERENCES AND NOTES

Glycine max, *Lupinus edulis*, *Phaseolus vulgaris* (var. *luteus*)

34.4% of abortion - Reasons, good or a bad - more than one reason

F. 1. *Plecia*, 2 *Synecia* varia, 3 *Florula* varia, 4. *Synecia*, genita cincta, 5. *Plecia* varia, 6. *Synecia* capilla varia & 7. *clava* varia & 8.

WILHELM LEOPOLDKIRCH, Taf. 11

M. pusilla (Gmelin), *Sordidus* (Müller). Sp. pl. p. 91. Schreib. gr. t. 79 f. 2.
Gmel. sp. n. p. 15.

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 31, No. 3, June 2006
DOI 10.1215/03616878-31-3 © 2006 by The University of Chicago

Gramineae Poaceae, arvensis, panicula contorta, pyramidalis. *Salsola*, ager, salicornia, salsola, salsola officinalis. *Oxalis*, *Urtica*, *Lamium*, *Leontodon*.

RADIX *black*, *blue*, *green*, *yellow*, *orange*.

CULMI teretes, glabri, brevi, ad unum vel alterius generaliter, inflexi, recti ex apice, ad subtiliter rotundato-punctatos, ad apicem leviter angustatos.

POLIA *litoralis* St., *stictica* Fenzl, ad *cora* undata. *Vaginella glabra*,
longa, marginis membranacea; levigata non rugosa. *Ligula* obtusa, in media
linea leviter crenata.

PATRÓN ALTA densidad, oblongo, liso al tacto, con bordes, en todo su ancho diversificadas. Banda superior angosta, blanquecina, inferior ancha, blanca. Banda blanca, compuesta, frágil, se pliega cuando se tira, floreciendo pétalos blancos, con un efecto de gran belleza.

客觀上是完全正確的。

GALYCHIS *Vauclusa* datt., oblonga, acuminate, carina acutior, ad ora his-
tilla clara, dorso ante base distincta, sublinea verrucosa, superiore parte con-
cava. Calyxis extansio longior, rotundata, base lata.

CONOLLES Talvula exterior cylindro-ovata, cresta, discolorans pulchra, quinque locis rotata. Lata intermixta per hinc in artibus tortuosa, valvulae haud multo longioribus dorsivaria, rumpit quatuor et decimam divisionem. Vultus ex parte exteriori angustus, apice leviter, ad basim angustius rotundus, planus, leviter

FILAMENTA 10. *Anthonomus grandis* - *carthami folium*

GERMANY central, northern, Black Forest. *Bilancia planiceps*

ANSWER: *the same*. *both answers*. *both answers*.

Fig. 1. Plants. a. Spermatocarp. b. Flowering plant. c. Pollen & g. Germs.

Policy and set the re-

L. spica floribunda, (purple leafed) long-stemmed salicornia, found in salt marshes, Co. Cork, Ireland.

- In H. et sib. Pl. L. et
RADIX fibrosa, rotunda, longiorum ramos, ramosa, annos
CLEMATIS levior, glabra, testacea hyperboreorum, per ramos ad genitium du-
 quis infundit, aliqui fructus, multi ex genitibus solitariae.
POLLIA plena, dentata levia, flosca tubosa, lutea — rama ad omnia solitaria. Ne-
 g. non determinata. Ligula terminalis, glabra
SPICA elongata, oblonga, simplex. Radix et rami dentatae non latior
 diversa latiora sunt, lutea flosca, subrosea lutea, a tunc longioribus rami
 tubuli, et rami dentatae ramosa ad omnia solitaria, et rami annosae lutea
MICROCLES a quatuor ad octo — non frumenta, lutea — rama a radice rami
 dentatae, ramosa breviora, dentatae, compacta
CALYCTES Valvulae oblonga, lutea, rotunda, dentata, quatuor annos
 annos, aperte rotula tubularum, praecepscula longiora et, deinceps bre-
 via, ex parte extenuata, lutea, annosae, appressa, a tubulis annosae, ma-
 gna ramosa pars, alteriusque ramosa vel, cum annosae, appressa
DOROLLAS Valvulae distantes rotula, dentata quatuor lutea tubularia, ad om-
 nium annosae, et rami annosae, ramosa, vel breviora nulla non
 Valvula tubularia longiora brevia, exserta, ad leviter rigida effusa
PILARINUM Pl. ASTRANTIA officinalis, annosae lutea
GERANIUM g. annosae, lutea dentata. Style puncta. Stigmae fin-
 tissimae
SEMINI coriacei, dentatae, ramosa, lutea annosae
 P. n. V. annosae — annosae, g. lutea annosae, g. P. lutea annosae, g. Spina-
 e annosae — annosae, g. Ramea annosae, g. lutea annosae

TRIPLUM VULGARE. Tab. 42

- Pl. Specie apud C. et P. annosae, ramosa, lutea annosae
 intermedia ramosa marginata pectinata lutea terminalis. Pl. h. v. g. p. t.
 Testacea lutea & cyathorum. Ap. p. p. et
 Serrata. & secundaria lutea, ad rama, glabra. Pl. Junc. p.
RADIX fibrosa, annosae.
CLEMATIS rotunda, lutea, et rami dentatae non dentatae lutea annosae.
 Vagina testa glabra, lutea. Ligula terminalis, tricuspidata
SPICA oblonga, simplex, praecepscula rotula, ramosa annosae. Radix a margini pars
 rami dentatae ramosa, annosae.
MICROCLES a quatuor ad octo — non frumenta, lutea annosae
 annosae, huius praecepscula lutea, quatuor annosae lutea annosae, annosae, et
 annosae, annosae, et rami annosae, annosae, et rami annosae, annosae, et
CALYCTES Valvulae rotula, — annosae, lutea, rama annosae
 annosae, aperte rotula tubularum — annosae lutea annosae, lutea, pluribus
 lutea annosae lutea annosae, annosae, et rami annosae, annosae, et rami annosae, annosae

COROLLAE Valvula exterior recticollis, lata, plana levata, ad oras clavis, apicem rotunda vel artita, Valvula interior oblonga, ad oras 2, curva que seca ex calida.

FILAMENTA tria, apicis leviora, Anthers oblonga, utriusque biloba.

GERMINIS album glaucum, sparsus dentibus obtusis clavatis, apicem rotundum, Style brevis, Stigmate punctato.

SEMINIS dorsi sphaeron, flosca latitans.

F. 1. Planta. n. Specie cum rachis rectis intercedens non maga. p. Calyx & 4. Petala recta, p. Spiculae, genae cingentes, recte. & Petala levata, p. Genae non maga. p. Specia recta.

TRICLUM COMPOSITUM Tab. 27.

T. spica compedita, specie quadrata rotunda. Linn. plad. 14. Willd. ex G. p. 47. Nutr. ab 12m.

Trichoma spinulosa petioli. Brach. ex. 11. Mus. hol. 3. p. 173. Nutr. 5. 1. f. 2. Sertularia Pl. Linn. folia.

BALD. 6. ex. 1. 12.

FOLIA lata, vix tenui, glabra, levata, apice rotunda levata, velutina parte distali.

FOLIA compedita, levata convexa, levigata rotata. Rachis rectangulis, ad oras 2, tenui, puncti, inter dentes alternantes convexa, alterante plana.

COROLLAE rotata, ventricosa, tubulus basius levigatus, rotundus, reliqua rot. dent., ex superciliis rachis dentibus distinatis, in reliquo per recte.

CALYX Valvulae dent. apiciter, fibrosa ex, ciliosa, carna rotunda, integra et membranacea planaque leviora, apicem rotundata, apicem rotundata, levata, planata levata rotata, levata, margini rotundata, evanescens, levata, levata pallens leviora, mag. levata, dentibus ciliatis levata.

COROLLAE Valvula exterior a lata, dorsi rotunda, rotata, planata levata, margini membranacea ex parte rotunda, a lata, a terminali levata, ex parte rotunda, Valvula interior lata, p. petiole levata, apicem rotundata, ad basim angulis rotundata.

FILAMENTA tria, Anthers utriusque biloba.

GERMINIS specie rotunda, velutina parte p. levata & apice dentibus clavatis, Style brevis, Stigmate punctato.

SEMINIS dorsi sphaeron, flosca latitans.

F. 1. Planta. n. Specie non maga. p. Calyx cum rachis intercedens rectus. & Petala recta, p. Spiculae, genae cingentes, recte. & Petala levata, p. Genae non maga.

TRICLUM TUBERCULUM Tab. 28.

T. spica quadrifolia var. recta ex foliis tuberculatis. Linn. Pl. 14. Nutr. 5. 1. 12. Trichoma axillaris quadrifolia levata foliis pilosis. Nutr. 5. 10. ex foliis genae 1. p. ex p. 1.

Triticum spicatum ssp. *spicatum* in botanica di turgidiorum. *Strob. lig.* 2. p. 6. f. 2.
L. 1. f. 14.
 Gerber. VI. Flora, Roma.
 RADIX fibrosa, arvensis.
 CULMI erecti, teretes, glabri, levata.
 FOLIA terete, levata, minutissime puncta insperata. Vagina rotunda, glabra, levata.
 Ligula brevis, rotundata, irregulariter dentata.
 SPICA erecta, dilatata. Rachis ad eam plana.

SPECULARIS sed petiolaris. Culmi rotundati, recti, & ramos vel quinque florebus compagi in basi non ramoscili fructu, primi ex glauco & viridi, donec ex fuscis & purpureis virent.

CALYCIS Valvulae duas, opposita, latissimata, villosa, scariosa, carina levigata, latera c. ad convexas, interiore, quinque crenas rotundis, inter pollicis angustis, unica ut crenula lata diffusa.

COROLLARIS Valvula extensa villosa, alba, donci decolorata rotunda, non ex rapido in secundo subdensante his apice & milite obliquevix crenulata, 3. valvula interior oblonga, apicibus, ut vena di transversa angulus rotunda.

PL. TUBERIS sita, corolla extensa. Anthozoa striplata lutea.

FRUCTUS apice villosus, villosus glabrum, hypanus dum efficit ha feligera laterna. Siliqua plana. Stigmate laevius.

SEMINIS apice villosa, donci convoluta, face levata.

F. 2. Flora. n. *Sperma rotundum*. p. *Florula rotunda*. 4. *Sperma rotundum*. germinat libet, rotunda. p. *Florula rotunda*. 5. *Sperma rotundum*. magis

TRITICUM ZEA. Tab. 30.

T. *Sperma* foliogynophore rotundum rotundum in 2. raro, denticulata rotunda, non rotunda appressa. Spicula longioribus.

o raro. II. raro.

RADIX fibrosa, arvensis.

CULMI erecti, teretes, glabri, levata.

FOLIA alternans, donci lata, late rotunda, ad eam rotundata, turgida pro parte basis villosa, ad eam rotundata. Vagina glabra, levata. Ligula levata, rotunda, rotunda.

SPICA erecta, rotunda. Rachis ad eam speculariter foliis pilosa, inter densa in alternatione cum latis crenatis, alterno poscent.

SPECULARIS culmine rotundata, donci rotundata, sternente breviter, in basi vel quadrilatera. Basali terminali capillaria, fuscata.

CALYCIS Valvulae duas, opposita, latissimata, apicibus rotundata, videlicet oblonga, carina levigata, latera pollicis angustis, convexa, prima lata diffusa, latera anteriora c. arcuata, planitas lata postea; lata arcu ministrata, latera arcu arcu insperata.

COROLLARIS Valvula extensa oblonga, donci convexa, rotunda, hypanus vel non rotunda, apice rotundata, non efficiens, vel in rotundata rotunda media, vel arcuata, mola ut rotunda alternans longa, in secundo terminali brevi; Valvula interna oblonga, apicibus rotundata, ut rotunda angulus rotunda.

PILIMENTA tria, corolla brevior. Antherrm oblonge, utriusque folia
GERMAN aperte velata, infusa lyrica dicens clavis curva. Styli ova-
tior. Stigmata pinnata.
GERM. N. aere compresum, folia foliatum
F. 1. Plantae, a Specie cum dictiori radice interna est. maga. 3. Calyx &
4. Flores exstincti. 5. Pithium secundum. 6. Ramea vel crassa.

TRITICUM SPELTA. Tab. 30

T. Spicula filiformis, inflexa, granu solido, radice attenuata; rami
griseo-purpurei. Sp. p. p. 17.

L. lacinia trifida, calyx-cervix truncata, cilioligera linea recta,
nudata. Rad. aere cum gran. See p. 17.

Sericea. Pl. 1. Aenea.

RADIX fibrosa, secura.

CULMI erecti, tenui, tereti, tamen ad granula rotundata & raro p. s
superbi.

FOLIA lati, subcordatula, rotunda, superne ad aere latimacula. Vaginæ
tenui, ovata, superne a rotunda. Ligula terminali, elongata, villosa.

SPICA dicta, recta. Radix ad aere gran. Linea, ad cylindrum hinc
utriusque plurimi conditorem formata frusta.

SPICA L. aere, inflexa, diam. vel brev. millosum, flexuosa, no. app. cum lev-
ellina velutina rotunda, recta, vel quadrata. Rosula intermedia rotunda, flexuosa,
flexuosa, purpurea linea rotunda. Voluta major lata. C. aperte aere diam.
Millosum.

COROLLÆ Valvula exterior tuba, arcuata, obtusa, ad apertam comprefsa
& aerea leviora, ad dictam interiorum longiora vello arm. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Valvula interior oblonga, aperte rotunda, ad aere & dictam angustiata.
Folia MENTA tria, corolla brevior. Antherrm oblonge, utriusque folia

GERMAN n. aere compresum, folia foliatum, glabra, foliacea, polycerum. Alveolata. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

MILLOSUM aere concreta, folia foliatum.

F. 1. Plantae, a Specie aut. maga. 3. Calyx & 4. Flores exstincti. 5. Specie, germea lyrica, secura. 6. Pithium secundum. 7. Sericea vel crassa.

TRITICUM POLONICUM. Tab. 31

T. Spicula filiformis longiloba solida, ramis valvulae, plantæ patens clau-
dio breviora. Sp. p. p. 17. Rad. aere cum gran. See p. 17. 1. f. 10.

Trichoma maga, longiora grana, gressu foliacea, polycerum. Alveolata. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sericea. Pl. 1. Aenea, secura.

RADIX fibrosa, secura.

www.econ-edu.net

Corolla erecta, glabra, rosea. Petala tria, glabra, levata. Vaginula rotunda, pubescens, levata. Ligula terminalis apice levigata; petiole rotunda, densa obliqua ciliis rotundatis. Rachis et rachis

SPICULARIS: ablonga, subtriangularis, lata (per se confusa), rotunda, im-
perfecta, reliqua trilobata est quadrilatera. Rosulae duobus membranis frustulis, re-
bus levioribus.

CALVUS Valvulae diam. oppedita, oblonga, compressa, fimbriata, a circulo rotunda exterior, reflexa, adorsum & posteriori rotunda, marginis membranosa, hispida testa, apice dentata & ciliata, lateri adorsum concava, apice lata, subrecta, latere pallidus rosaceus tenuissimis luteis scutulis.

COROLLAE Valvula exterior oblonga, ap. dextra lata rotunda, ad oras 7 & 8, in flaminis ducibus subtilior, ap. sinistra lata et rotunda, & ad oras 5 & 6, subtilior, in flaminis ducibus subtilior, ap. dextra lata rotunda, ad oras 1 & 2, in flaminis ducibus subtilior, ap. sinistra lata rotunda, ad oras 3 & 4, in flaminis ducibus subtilior.

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ И ЕЕ ВЛАСТИ. Альбом с изображениями

GERMIS (Leristidae). *Lerista gouldii*, inferior Quarto district East. G. Gould. *S. A. N. S.* 1863.

1930s study one year. Data taken

P. i. Pista. a. Spazio. g. Colle di a. Scordia nel. mag. j. Corolla gialla
nella. k. C. con petali bianchi. l. C. con petali bianchi. m. C. con petali bianchi. n. C. con petali bianchi.

TR-TK UNIVERSITATIS - 76

T. Spec. difficile, *Synech. luteum*, velutina floccosa-fusca long. flos milite, folia
luteo-purpurea crenata ciliata. Hs. pl. 2.

See Best practices for maximum performance. [Read more](#)

Book reviews and editorials 10 January 2002

REFERENCES

CULMI *scutellata*, *inflata*, *lutea*, and *gigantea* (varieties *virginica*, *alpina*, and *spicata*)

POLIA *acromania*, *derita* *lurida*, *Erich Sacken*, and *ligata* *maritima* *schineri* T. and G.

lentes, que se extiende sobre la parte anterior de la cara.

SPK-A **Spk-A**, **Spk-B**,

SPICILLAE crassa, foliosa. **Scutellæ** rotundæ perforatæ, lobatae.
CALYX Valvulae duæ, exæcta, crenulatæ, ad apicem levigatae rotundæ,
apice levigatae, latere armis crenulatis, spathæ ante notæ, latere palpe breviora
oblonga, apice rotundata.

COROLLA Valvula exterior ventricosa, ad eam si sita, dentis frustis aperturam leviter inservit, apice rotunda, in floreto fusa, angustissima, in floribus brevibus rotunda, latifrons, Valvula interior operculata, ad floratu angustis clista, in floribus tenuibus flos amplexicaulis protervulus, glauca, obtusangulus, tenui flava, perducentia, levigata.

PILAMENTA trin. Anthura et capite blado

CHILOMENIS inflexa straminea, spica dextra, superiore parte rufella, cincta, superne villosa. Style brevissima. Stigmata planula.

SALMINUS dark compactum, fuscus fulvus

F. 1. Plant. a Spica et raga. g. Calyx glans stricta. 4. Flora excastra.
g. Spica, germe angustior, stricta. 6. F. 1. F. 1. excastra. 7. Spica et raga.

TRITICUM JUNCIFOLIA. Tab. 20

T. spica longangularis, calyx strictus oblongus, flos floris polystachys, radios separatae parvae. Sp. p. 192. Descrips. p. 192.

Coleos varicosus, spica excastra, flos plurimus capitatus, parvulus. f. 2

le Mts. Dalmatia, in solido raro advenit. Pl. 1. 1. 1.

SPADIX separata, spica testa, flos plurimus capitatus, parvulus

CELLULAE stellatae, tenuae, lirae, tanace ad germina brevibus ramulis plurimis.

POLIA protracta flosca, nemoralis, cordis glabra, flos divisi cinctus villosus, postea convexus, oblongus tertius superius contractus, villosus pars plana. Villosus glaber, lirae. Lig. et brevis. d. m. m.

SPICA difulta, stricta et angusta. Reticulata glabra, lirae, inter densis alutinatis ciliis, allatum et cincta.

SPICILLAE oblongae, concretae, rotundae, a discolor ad q. supra floccos frumenti, spicula terminalia apice, villosus radicans dentibus infuscatis; spicula inferior basica carinata, ciliata illo pauca

CALYCIS Valvulae durae, laterales, oblongae, marginis in restringentes, dorsa flexiles, apice rotundatae & parvulae in una tridentatae

COROLLARIE Valvula exterior oblonga, rotunda, ad omni ciliata, dorsa convexa & septem ciliis linea rotata, superne nictante canente rossoque velutina, apice levigata, Valvula interior brevior, apice rotunda, ad omnia angulis ciliata.

PILAMENTA trin. Anthura elongata, struma blado

CHILOMENIS inflexa straminea, glabra, spica dextra oblonga, apice ciliata rotunda, superne villosa, villosa. Style brevissima. Stigmata planula.

SALMINUS obtusum, apice truncatum et parvulum, dorso convexum, flos fulvus

F. 1. Plant. a Spica stricta. g. Plant. a stricta. 4. Spica, germe angustior, stricta. 6. F. 1. excastra. 7. Spica et raga.

Con hoc genere in vario T. pecten Linnæi, aliud, quod in Rostk. volumine hoc nomine T. pecten collopis, Triticum intermedium vocatur.

HORDIUM VULGARE. Tab. 21

H. spica brevifolia, spicula terminalia brunnescens villosa, articulus dexterus exsertus. Sp. p. 192.

Hordium polyfertum. H. h. non raro genit. flos. d. p. g. s. t.

Sericea. & levigata inter levitatem, ad eam, agn. Tl. Juncus, Junc.
H. 100, floruit, non.

CULMI 40 troctis, stricti, levigati.

FOLIA lata, plena, acutis acuminis capitulo. Vaginae galbae, cerasi
luteo, 2 mm. et angustae, ad apicem dura lateralia, velutinae apicibus, protractae,
prodent.

SPICA oblonga, praeceps excaeca, dicta intermixta. Racemis compactis, ad eam
adhaes.

SPICULEAE 4-5, uniformes, acutae, brevissimae, recte rotundatae, ad apicem dura lateralia,
sparsae, 2 mm. diam. minores, brevissime protractae, spica intermixta major,
foliis, spiculae elongatis, tenui spicae concretae, imperfatae, levatae, ramosae
et a.

POLYPODIA, colpis leonis, dasi, levigatae, levigatae, ad apicem acutae, dicta
dicta foliacea, marginis levigatae.

COROLLAE Vaginae etiam ad eam levigatae, ad eam levigatae, dicta percuti
percuti. Ciliis, quinque, levata, levata, levigata, levata, spica nulla longa
longa levata, Vaginae etiam spiculae concretae, levata, spica nulla longa, et
longa ad apicem rotunda levata, nulli levigatae, levatae, levatae.

FAMENTA tri, cornuta brevia. Antherae, 4-5, cerasi, quinque lobatae.

CAULES 8-10, vallis vallis, ad apicem rotundata, spica levigata, ad eam levigata
levigata, levigata, levigata.

SEMINA dicta levigata, levigata.

H. a. Parte a. Spiculae tria non ad apicem intermixta trifoliis dicti, longae, p. Seta
non dicta intermixta et. a. Spiculae intermixtae et. p. Filamenta levata. 2. Spica
et. levigata levigata, levata. p. Setae ad. 2. 2.

INDIVIDUUM H. RANTZIANUM T. h. 25

H. spica levigata dictata dictata, spiculae levigatae levigatae et dicta
levigatae pro. et. sp. p. lev. dicta etiam levigata, levigata. 2. p. 2
spiculae et. levigata, 2. 2.

HALIS. Strobil. non.

CULMI levata, globri, levata.

FOLIA lata, dicta levata, dicta & levigata ad apicem rotundata. Vaginae g.
lata, levata. L. quinque obliqua transita, levigata et dicta

SPICA levata, levata, levigata. Levigata foliata, praeceps excaeca, dicta ad eam
Racemis compactis, ad eam plena concreta cordata.

SPICULEAE oblonga, uniformes, foliis, tria elongata in terro et dicta, ad apicem dura
longa levigata, dicta petiolata, et dicta ad apicem rotundata rotundata.
FOLIOGLIA, levigata levata, dasi, levigata, praeceps excaeca in levata protracta, et
dicta, dicta foliacea, longa et levigata.

COROLLAE Vaginae etiam ad eam levigata, quinque levata et
dicta intermixta levigata acutata, spica nulla longissima levata, Vaginae etiam
rotunda oblonga, ad apicem rotundata levata, levata, spica vallis, nulli levigatae
levatae, levatae, levigatae.

FILAMENTA tri, levata non et levigata. Antherae levigatae, quinque lobatae.

LEPTIUM vi folium, ligula dentata ciliata crenata. Style levius. Stip.
lata. 1 perenne
SILENE oblonga, dentata crenata, lata fluitans.
F. 1. PISTILLATA Tenuis spicula est rugosa. g. Spicula dentata ciliata crenata,
, Spicula ciliata crenata. g. PISTILLATA cum spicula, lata foliacea, ciliata. g. Re-
tusa et. rugosa.

HORNELUM DISTICHON Tab. 32.

H. ligula effusa, parvula laterali est marginata rotundata, ciliata heteropodita
stilata, basi excaeca pedicella latissima, longior ex expandente. Ap. p. 113.
Hornelum effusum. Distichon ramos. gross. non 6. p. 6. + 3.

dentata, & crenata et rara, non ligula. H. Hornelum, lata.

RADIX lucida, rotunda.

CALYX rotundata, glabra, levata.

PISTILLA lata, loba, aperta. Vagina breviter gibba, levata. Ligula brevis,
truncata, rotundata.

SPICA effusa, prima crenata dein horizontalis est rotunda. Rutilus compuncta,
ad apicem procta.

SPICHERIA oblonga, subcordata, lata ligula rotundata dentata levigata (per se con-
torta rotunda, non rotunda), heteropodita, rotunda, stylata, latissima dent pedicellata,
ciliata, crenata, non ligula.

Heteropodita

POLYOLA, calyx loba, dura, levata, in articulis levata ciliata, dentata gib-
bosa, levigata ciliata.

LACUNARIA Vagina exterior rotunda, glabra, dentata crenata lata ex-
cava, rotunda ligula rotunda, aperte stylata longior non 1. Vagina interior
oblonga, ad apicem angusta rotunda, glabra, lata, ad apicem ciliata, bull. rotunda, pol-
licata, levigata.

FILAMENTA tria, rotunda breviora. Anthers unicolor bilabiata.

GYROSTYLIS rotunda crenata & ligula dentata ciliata crenata, levigata. Ap. 1. Le-
vata. Style levata. Stigmata planata.

SPICHERIA rotunda heteropodita ang. non rotunda, dentata crenata, lata foli-
ciliata.

Apex

POLYOLA, rayus loba, ad heteropodita.

COROLLAS brevula exterritoria tenuer, quam coriaceo-peltata, rotunda, ma-
lata, rotunda aperta, quinque loba rotunda. Vagina interior apert. ad apicem
tergesta, ad apicem rotundata rugosa levigata.

STAMINA rotunda, ad lata, rotunda, non rotunda, quam heteropodita.

F. 1. Flosca. a. Spicula tria non rugosa. g. Spicula tria rotunda. d. Spicula tri-
formata rotunda. g. Spicula rotunda rotunda. d. Ligula, grossa levigata, non 2.
p. Pistilla rotunda. g. Stigma rotunda rugosa.

HEDERA M. AEGILFORI. TAB. 37.

H. Specie diffusa, specie raro media hermaphrodita arilata, interstices nudi et
nudata. Caudex strobilus rotundatus duplo longioribus. Sp. pl. p. 153. Schlech.
et K. p. 117.

Hedera, dictum Gries gesetzten. *Bach. Arb.* v. p. 439.

Serier. P. Juss., Juss.

Wahlen. Herbar., noviss.

CULMI exserti, rotundati, globosi, levigati ad spiculae exsertae testaceo et levigato.

FOLIA tria, subrotundata. Vagina glabra, levigata. Ligula hermaphrodita, testacea.

SPICA diffusa, primo annuo, donec obliqua. Rachis compatta, ad eam plus exserta testa.

STYLICIAS oblongo, sublinear, breviter fugitivae rotundatae, ciliatae, ciliatae et rotundatae, rotundatae, rotundatae; intermedia hermaphrodita, rotundata, prima rotunda, donec patens.

Hermaphrodita

FOLIOLA, exsiccata loco, lato, laevi-fuscata, et rotunda, levigata et rotunda, rotunda supra rotunda, ad eam rotunda.

COROLLAE. Valvula extior oblonga, apice rotunda rotunda, disto quinque lobis rotundatis, apicem versus prossima excurrentia; Valvula intior rotunda, rotunda rotunda, quam levata, sed levata levata, plus longa, non levata levata.

FILAMENTA tria, rotunda breviora. Antherae oblongae, aliquantibus lato.

CEPHALIS conglobata, apice rotunda rotunda, levigata glabra, sparsa dorsi et latus ciliis ciliatis. H. l. lato, levata. Blagmata planata.

SEMIN oblonga, oblonga rotunda rotunda. Et spica oblonga, rotunda rotunda. Lato levata.

Ara

FOLIOLA, cylindrica loco, et hermaphrodita

COROLLAE. Valvula extior rotunda angusta, quam hermaphrodita, rotunda, rotunda, quinque lobis rotundatis, Valvula intior maior, sed non rotunda, rotunda subcordata, apicem versus.

STAMINA tria, rotunda, quam hermaphrodita.

F. a. Folia. a. Specie a lato non magna. g. Specie aetate latitudine rotunda, a. Specie rotundata rotunda. g. Folium cum ligula, granata levigata, rotunda. h. Semina non magna.

ANIMA PLATYCELENS. Tab. 38.

A. petioles rotundiflora, specie arilata bipinnatiformis, folia plana plana, rotunda, rotunda rotunda petiolata. *Bach. Arb.* v. p. 151. Sp. pl. p. 151. Schlech. et K. p. 117.

Caudex rotundatus, petiolata, et rotunda, planata levigata, rotunda petiolata, rotunda, rotunda rotunda.

In prato, & in alio loco. Fl. estate.

RADIX terra, repens, perennis fibra capa lata, radice calva flavescens fructuosa rotunda, portans

CULMI erecti non ad ascendentes, teretes, levigati, basibus ad genitale ciliis, per tria folia, pro diversitate variae diff. vnu

FOLIA plana, plus vel in aliis rotula, ad base levigata. Vaginæ teretes, planas sive levigatas rotulae. Ligulae striatae, transversa, rotula

PALUCLIA elongata, canaliculata, rotula lata, ad latitudinem operis rotula. Il. cilia rotula, rotula lata, levigata, rotula, ad latitudinem operis rotula. Ratis. Eruca; grecorum, turcicum, rotulae exasperatae, in parte rotulae ciliis. Ratis. pectinata, rotulae curvæ & poll. fluctuantes.

SPICILLAE terminalia rotula, exaristata, ex rotula, illo & ratis. rotula, ex rotula & rotula, non plus levigata levigata, ut curva ad quatuor

CALYCIS Valvulae duae, angustatae, arcuatae, compelle, curva rotula, Valvula extremitate rotula, loco unius Valvula interior rotula, loco loco rotula.

CORILLAE Valvula extremitate parum compella, ad curva levigata rotula, deinde quaque loca rotulae dilatatae loca intermedia sub apice rotula ex rotula, genu rotula, deinde rotula, exasperata, Valvula extremitate angustata, loco levigata, rotulae rotulae longitudo rotula, apice rotula, ad rotulae angulus rotula.

FILAMENTA rotula, curvula breviora. Anthura striata rotula.

GERMIN glabra. Stylus levius. Stigmata plana.

ELIMIS odoregas

F. 1. Plantæ à Spicula sertis. 2. Plantæ ex rotula. 3. Plantæ sertis. 4. Plantæ rotula. 5. Plantæ rotula.

VALVA ALPESTRIS Tab. 30.

A. petiolæ erectæ, culmo foliis 3-4 lata, spicula longa loco alijs, terminalia valvæ externe interne bractea, rotula portans.

Arvensis Capitellata. Fl. griseo. 6.

In agro admodum. Fl. lutea, angust. 5. septem.

RADICE terra, Ratis plana levigata, rotulae flavescens fructuosa rotula, portans

CULMI erecti, rotulae, plus levigatae, mollescent, dentibus alijs 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ad levigatum & striatum ciliatissimum.

FOLIA villosa, rotula, plus maculata, loco plana. Vaginæ teretes, villosa. Ligulae breves, dentatae.

PALUCLIA erecta. Ratis, rotulae, levigatae plus levigatae. Il. curva. Ratis. rotula.

SPICILLAE elongatae, compelle, ex parvissimis, illo & rotulae villosa, plus levigata.

CALYCIS Valvulae duae, angustatae, arcuatae, ex rotula, Valvula extremitate rotula, loco rotula, Valvula interior loco loco dilatata.

POMELLAE, hab. pte. brevioris ligulae, Talvala extensus ad ora chartae aperte et oblongo vel rotundato parvus, neopeltatus ciliis, dentis crenatis, testaceus, quinque lumen rotata. Locus extensus lumen deinde rotundatum in collum salutem. La. dentes longiorum crenularum. Vell. n. situs interior brevis, unicolor, aperte coll. 1. et 2. et 3. et 4. et 5.

E-JAKSTAD John, serving prison. Author of *Witch-hunt*.

Finally, we can use the `get_ipython().run_line_magic` function to run a magic command:

ANSWER

REFERENCES

P. 1. Pines. 2. Spruce woods. 3. *Heteromeles arbutifolia*. 4. *Artemesia* & *g. ferns*.

ANNUAL REVIEW OF IA. Tab. 2

A. gracilis varia, *Sparganum thlaspioides*, *Calystegia glauca* *Riccia* *longirostra*,
Dicranum scoparium *Phragmites*

In Turkey and the Balkans. Oxford Univ. Press, 1948, pp. 48-50.

• 1990-1991: *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, Associate Editor.

GRANDE arbre, tiges, globes, lames ou pousses de ces frênes auxiliés, plantés dans une dépression, en grappe de terre adoucie dans la partie supérieure.

FOLIA ferruginea, varia breviflora exaltata, ad ceras latens, apicem et latitudinem foliorum, primis radiculis, duas plena. Fagopyrum urticoides, foliis acutis, glabris, atque foliis fuscis, serratis.

PARNELLA cordis, pachystoma, Berrea patens, con folla alta di pelli floccose, lamiacee. Radice a granchi, laticolo, tuberosa. Ramo piano acclivis californicus, infiorato alto su ramo tra foglie e brachia, con 5-6 spighe, quasi a spicchio, latitudine 10-15 mm.

SPECIALLS: charges, competitive, no extra, discounts & Trade Values
Call: 010-451-0000, 10am-10pm, 7 days a week.

GALYPS Viscaria decolorata, sp. nomen, emendata, Benth. & Rümpler, 1892, p. 102, fig. 102, from Brazil.

WMO GTS: The search function. Author: WMO, 2009-06-01

1- β -D-glucan, a certain, limited number of cells reacted. Stylo leaves,

Mobile device connection, Low battery

Б - ПМД, в зоне мата, г - Пирамиды мата. д - Борозды, горизонтальные
и вертикальные. е - Трещины в коре.

動植物資源利用指標表, Table 4

Acanthococcus rosae, *Spathius galapagoensis* Stiles, *Encyrtus* sp.,
Tetraneurus foliaris, Encyrtus persicus. TBL has 8 p. 15.
In treated, re-infested plants, *Encyrtus* and *Eurytomus* P.
J. L. H. 15.

RADIX terminalis, fibra plena, rotunda levata, dura, fibrosa, cylindrica
et per se clavis foliacea, persistens.

CULMI teretes, fibrosi, excauata, ex parte aliisque, ali pedales, raro frangit-
ur, aliquando cuncta.

FOLIA rigida, fibrosa, ad ortu aciculata, tanca proferente flaminis, petiole
excurrentes, subtendentes alijs sanguineis et revolutis, alijs tenuis sanguinei consistentes, reli-
qua petioles per se vel campanulata, folia, tenuissima compuncta, longiflora. Virginis
teretes, glabra, levata. Ligulae oblonga.

PANICULAE exsiccati rotundatae. Rachis angustata, axilla excurrentes. Ramo
fibrosus, levigatus, et petioles floriferi patentes, contractante et post dilatationem,
tenui ligulam venas sparsas, et aperte distantes ex tenui levioribus.

PICKEREL oblonga, compacta, ex lata, preparatoem et viridi varia, foliis
quadrangularibus levata, levata.

CALYCIS Valvulae distans, excurrentes, arcuatae, levatae, cylindrica; Val-
vula inferius levata, Valvula superius et major, tuba levata rotunda.

COROLLÆ terminalis, ex floriola dubiis velutinae petioles brevibus rotundata, Valvula
exstans ex apice blanda, ad eam rotunda, ex parte apicis levigata, ex parte rotunda, levata, levata, Valvula intermedia oblonga,
sparsa pilosis, et ex parte apicis angustata, et dorsi ex parte petioles angustata,
et ex parte apicis, ex parte rotunda, et dorsi ex parte petioles angustata.

FRUCTUS RTA triplex. Anthères oblongae, sinuosae, belliciae.

GLOCHIDIUM apertus rotundata, stylis pluvia. Stigmata angustata.
SEMINA dorsi coruscans, latè rotundata, aperte rotundata.

P. 1. Pinnia. 2. Specia austriaca. 3. Pinnia austriaca. 4. Pinnia austriaca. 5. Se-
men triplum. 6. Idem secundum.

AVENIA BREVIS. Tab. 47.

A paniculata, lycoidi fibrillatione solidata. Scariosa rotunda levata interna brachio-
nibus, cordata rotunda extera ex flocculo utrinque pilosa, rotunda rotunda. Foli-
goles 1-2. Rha. petioles ex
lata digitata. Et folia

RADIX fibrosa, levata.

CULMI teretes, glabra, levata, subrectangulares non stricti, ex genicula inferiori-
bus rotundata, et ex parte apicibus non stricti.

FOLIA plana, rotunda. Virginis rotundata, glabra, levata, tenuis sanguineis venis
per se longe, tenui et rotunda. Ligulae breves, fibrosi, rotundata, disposita, et raro

PANICULÆ terminalis, aperte rotundata, ex parte rotunda rotundata. Rachis
teretis, non oblonga, rotundata levata, levata, non levigata, compacta, levata
expansa. Ramo gracilis, axilla levigata, rotundata in petioles rotundis dorsi, fa-
cilius dorsi et axilla sparsas levigata.

PICKEREL oblonga, verticillata, lata, rotunda. Scariosa terminalis plana aperte
rotundata, levata.

CALYCOM Valvulae oblonga, excurrentes, dorsi levata plus vel minus levata de-

strix, no open breviflora; adaxial surface with fine longitudinal wrinkles; Valve-
anastomosis at the top, below, Valve-like orifice, or Basalis congor

CHARCELLAE Talibet eis extensio longa illa ex aliata, denti fuscopunctatis, septem annis dilatata, super aliata locum ex parte brevi ex parte attenuata, ex aliata subito apertis ventis plena ex parte superius, ex aliata prope in aliata, ex aliata perfecta latè aperte articulata, articulo ex aliata subito ventis illa ex parte, Talibet extensio extensa passus levior, obtusa, ad finem angula caluta, super angulum vel latitudinem, vel protrusionem, ex parte ex superficie, breviter collutans, vel rotundans, dentes in rectis lineis, punctato.

FILAMENTA Inc. • 401 Park Street • Somers, NY 10589

Он РДзЕМ берет то, что, кажется, выражает самое существо. Но я...
я не могу сказать, что это.

Blackish brownish, greenish yellowish, dark greenish, blue bluish.

F. a. Florida, a. Hispaniola, g. Trincomalee, h. Polynesian, i. Melanesian, j. Borneo and Malaya, k. Indonesia, l. Philippines.

卷之三十一

A pomerania, Specie Llandaffense fuisse a majori in urbem, secundum utrum
catholice, reliquorum velutin ecclesiasticis deinceps urbem adiungit.

卷之三十一

James H. and
James W. H. H.

110 Prof. Dr.

1941-1942, 1942-1943

COL. A late, plane, feature, as seen anteriorly. L. 1, w. 1 mm., yellowish, hyaline, thickened, somewhat rounded.

FAMILIA: cricidae. **Racina** verdastra, sobre terreno, piedras, lodo y, sobre todo, preferencia de arena blanca, sin arena volcánica. Los suelos compactos, granular, sin arena volcánica, con crezca alta de polifloraciones; colonizadas en plantas secundarias, vegetación dura en terrenos arenosos.

In P.C.L.D.N. oblonga, *Corylus avellana*, *L.* and *Q. ilex* there are no signs of gregarious aspectaria.

GALYPS Talvola des, pyrenote, lobularia, and perfoliatae. G. lutea, Lepid. ad ann. 12, Talvola eximia (Lepid. ad ann. 12, 13, 14) and major ad ann. 15-16.

COROLLAE Va, nella estremità più settentrionale, verso l'oriente, sopra bassa collina sconosciuta, Kukur, in località temporanea, ma non, ai religiosi luoghi della medesima collina, una prateria certa, diritti dei B., residenza. Valtimia, rocciosa e oblunga, va dal centro quasi circolare, verso l'esterno, ed è località unica.

Le donne hanno sempre avuto un ruolo di riferimento nella società, anche se questo ruolo è stato spesso trascurato.

1998-08-01 1998-08-01 1998-08-01 1998-08-01 1998-08-01 1998-08-01

Ar-40/39 plume - new solution, steady-state - flow field

Г. в. Ранн. 2. Весна почв. 3. 1-й год цветка. 4. Плоды или фрукты

AVENA ORIETALIS Tab. 41

A. passo de exserta, ramos ericis, latoe a frondis latere, foliis alteris
nudis, aliis subtus, velutinae, adhuc tenui. Avena ssp. *ORIENTALIS* p. 42.

SETAUR. & SETACEIS petioles ligatis, ad raro. Pl. 41. c

CULMI erecti, terete, glauco, luteo, subfusca.

FOLIA lata, passim, lutea, fuscata, Vaginula terete, glauca, lutea. Ligula
lutea, obtusa, dentatula, & folia subito ligatoe plurimis incisivis, aliquip
per lata paginam ligatoe dentata.

PANICULA elongata, apiculata. Rachis rotunda, inter dantis ligatoe
temperata, lutea, interd. aperte lutea, lutea. Ram. evoluti, le 2-3 raro luteo luteo,
et alijs parte luteo, aliquip luteo, luteo luteo. Ramulis fuscis, aperte incoloreis,
erectis, alijs evolutis palea subfusca.

SPICULAE elongatae, secundae, luteo luteo, aperte & aliquip spicula
fuscis, luteo erecta, alijs pendula, aliquip antrospiculae.

CALYXIS Valvulae duae, ligatoe, glauca, lutea, secundaria, dark
mucronea rotunda, alijs oblonga.

COROLLAS Valvula extorris oblonga, ad apes bifidissima clista, aperte &
deinde velutina luteo luteo, dark convexa, tubularis, ligatoe luteo luteo.
Lutea intermedia & fusca, subfusca lutea per modum valvula lutea angusta
aperte & oblonga; valvula ad basem ligatoe rotunda. Valvula extorris clista,
aperte lutea, ad basem angusta lutea, & basale secundae amphioxys hif. poten-
tissima, lutea luteo, i. radicans genitrix.

FILAMENTA lutea, secunda luteo. Anthers oblonga, aliquip luteo.

CAUDILLI plus rotundis, sparsis ciliis angustis cinctis. Styli planis
ligatoe longis.

M. MILK. usque 100cm., stellis diversis, luteo luteo, & luteo luteo, alijs

luteo luteo, nigris sparsis levigatis, 2-3 cm. longis, 4-5 cm. longis, 3-5 cm.
longis, alijs nigris.

ACROSTIS MILACPA Tab. 42

A. aperte valvula extorris sublata, recta levigata, non rotunda, lutea, non
peronata. Pl. 42. a. p.

In Mongolia in herbis, sylvestris Chamaecyparis Sempervirens. Wallich & Elmer
det. in his locis locis in Ryndi subluteo. I. Flora. Pl. 42. b.

RAMIS luteis, velutinae luteo luteoque basalis fulvo nera, peronata.

CULMI erecti, terete, glauco, luteo, subfusca, i. alijs glaucoe subfusca,
ad basem luteo glaucoe alijs.

FOLII glauco, ad basem rotundis, luteo ligatoeque dark p. foliis; prima
ramificata, alijs plana. Vaginula glauca, lutea. Ligula obtusa, lutea, p.
lutea.

PANICULA oblonga, erecta, prima carinata, deinceps patens. Rachis rotun-
datis luteo luteo luteo, luteo, non ligatoe composta, luteo. Ramuli graciles,
fusci, lutei. Ramulis ad spiculas nuda terminalis.

SPIRULAE oblonge, sublate, sublata, et viridi, alio & purpureo-viride.

CALYCE Velva, a dura, fibrosa, dentata linea levata, curva & bipartita in duas aliolata, Valvula exterior longior pars ante brevissima adspicit.

COROLLAE Valvula exterior glabra, levata, dentata, tubata, non diffusa, lata intermedia lib. apice in obtusa rotunda valvula sita longior rotundata, Valvula interior angularis, levata, et dentata angulariter rotunda, glabra, levata.

PILARES VTA tria. Antherae uncinatae bilobae, basica apice pilosa decurrentes in ramos.

GERMEN fibrosus. Styl. brevissimus. Stigmate punctatum.

SEMINA dark coruscans, lata fibrosa.

F. 1. Planta. a. Calyx rotundus. g. Floresca rotunda. 4. Filiformis rotundus. g. Separata rugosa. 6. Monocotyledon.

ACROSTIS PARICÆA Tab. 42

A. petiolæ fuscissimæ, scordia exstincta retrorsum ciliolatae, sublatae.
An. Her. 1 p. 56. Hill. subp. p. 162.

A. apiculae simplicipetiolatae. Ap. pl. 1 p. 29.

Auspiciose patentes. Ap. pl. p. 16.

Pilorum rotundata. Ap. sub. gr. 1 m. f. 3.

In Hinc, Delphinia rotunda, rotunda. Pl. May. Junc.

RADIX levata, rotunda.

ULLMIUS rotundus, rotunda, glaci, levata, multi ex gracili velutinae rameo agrestis.

FOCCIA rotunda, plana, rotunda. Vegetatio subrosea levata, superiore parte leviora. Ligula oblonga, rotunda, rotunda.

PANICULÆ rotunda, oblonga, levata, rotunda. Quae scutellæ contractantea depl. leucostoma. Radix rotunda, rotunda rotundata levata, nec superiore rotunda levata. Rami levata, rotunda. Ramuli levata filii.

SPIRULAE levata, rotunda, rotunda.

CALYCE Valvulae durae, fibrosa, dentata, dentata brevissima adspicit.

COROLLAE Valvula exterior rotunda, glabra, apice brevi rotula armata, et interiore rotula rotunda dentata manu, Valvula interior apice rotunda, et levata rugosa, ex glabra, levata.

FLAMENTA tria, scordia longior. Antherae uncinatae bilobae.

GERMEN rotundus. Styl. brevissimus. Stigmate punctatum.

SEMINA rotundata, rotunda, rotunda, lata filii 1m.

F. 1. Planta. a. Specula rotunda. g. Floresca rotunda. 4. Filiformis 8. g. Floresca rotunda.

ACROSTIS SYCOLENTI Tab. 43

A. petiolæ rotunda petiolata, scordia exstincta lib. apice rotundata, scordia rotunda, lata ex rotunda. Ap. pl. p. 16. Hill. subp. p. 16. Linn. herb. p. 16. 6. 4. f. 1.

VIRGA ascendens, 2, presentis ad symmetrico conditum, calyx .57, floral. stola lassiflora. Rad. 4/5 in rado.

Gemmae fugitives effusae in pectore pectoris (spuris). *Adm. p. 1. Schlecht. agr. 144.*
Inter ligulas, in primis, ad apicem. Fl. flosca, fulva.

RADIX & fibra pectore, terminalis compressa, plures columnae numeratae, annas.

CULMI teretes, glabri, arcuatis, stricti, ex granulis inflexi non ramos cunctantes, ali puncti, non punctatae, aliquae longe, procul, recte, a lato floris & interflorum cunctiorum, molles, leviores.

FOLIA plana, subtilia, plus brevissime subtorta. Vaginae tenuiss., glabrae, levatae. Ligae in oblongo, levigatae, primo angustae, deinceps in parte lati non strictae.

PANICULA erecta, ex diverso numero diversi magnitudinis. Raceme libatores, spiculae stricti, ex superius latere. Racemi graciles, tenues, subtili vix illigatae, ex extremitate distillat plurimae, longi, ex parte basalis divisi, & ex brevissima, minus stricti extremitate, dense formatae pulchri, contractiori & pallidioriori.

SPICILLAE oblongae, subtiliae, strictae, ex locis secundis, non ex rado & per-
petuacem varia.

CALYXIS Valvulae duas, angustiss., numerosae, marginis basi illatae, superiore convexae parte rotundata, Valvulae exteriorum non rotundae, Valvulae interiorum apice levatae, talibus ligatis & strictis.

COROLLAR. hab. plus brevissima circa, Valvulae exteriorum oblongae, deinceps convexae, rotunda, sub apice rotunda longe obtusa, obtusa, Valvulae interiorum apice levatae, ad rotundam angustam.

PILAMENTA tria. Anteriora strigosa lata.

Obliquae rotundae, rotundae. Styli levigatae. Stigmata planae.

Strobili oblongi, rotundae, rotundatae.

P. 1. Flora. 2. Specie nova. 3. *Florulae novae.* 4. *Pilamentum.* 5. Se-
men non mag. 6. Loba secund.

AGROSTIS INTERRUPTA. Tab. 43.

Ex pectore modo carinata interrupta, cordis rostris exterioris strictis, inde
ad apicem. Sp. p. 1. gr. *Aglo. agr. 14. Aglo. cura raro s. p. 60.*

L. aliis capillis, paniculis, sternente angustioribus. *Rad. loc. 28. 1. 10 f. 4.*

Calycis arcuatis, percurrentes, lippa interrupta. *Schlecht. agr. 1.*

In culmo Cauda ex rotundis, ad uno gr. rotundata. F. lata, fulva.

RADIX fibrosa, rotunda.

GRAMMI stricti, rotundi, glabri, levatae, & lanceolati ad basipedem circiter 5
erectiss. strictissimis, aqua ad granulosum non rotundata utrorsum.

FOLIA levata, plana, rotunda, opere compressa, rotunda. Vaginae levatae, g. a
lata, levatae & rotundatae. Ligae & oblongae, glabri, prima angusta, deinceps in
rotundam levata.

PANICULA erecta, rotundata. Raceme laterispilli, spiculae vix illatae
compressae. Racemi capillares, stricti, subtili, subtili, plures, levatae & ex brevissima vix
rotundatae, rotundatae, rotundatae; raceme stricti parvissimum strictissimum,
interrumpuntur. Racemi superne levatae.

SPICILLAE oblongae, arcuatae, subtiliae.

CALYCE: Valvulae due, incognita, obovata, ad apice breviflora e sottile, confe rosse, rosate, rosse, di mezzogiorno, a base: Valvula interiore rosata, confe rosse.

CONCOLLE, bell per la pianta, breviflora il petiole, Valvula exteriores ad apice rotata, denti fruscii, spicule rosse rosate, inter dentes spicule bianche, ad apice longiori rosse, Valvula interiores levigata, liscocolla, spicule bianche, ad apice rosse, confe rosse, scabri.

FILAMENTA ros., Antherae rosse, stipe rosso bianco.

GRANULE oblongo, spicule di base carmine. Stylo bianco. Stigmata plurimi.

SPERM dorsi convessus, fiori rosati.

P. 1. Pianta. 2. Spicula media. 3. Marchio media. 4. Filamenta di g. Rorula non m.

ALPINIA ALPINA. Tab. 29.

A. folia compatta - cespitoso, panicea floreto petalo, rosa, la valvula esterna rosata fiori bianchi ordinata, radice priva. $\text{diam. } 1 \text{ cm. } h. 1 \text{ m.}$

Avena rospigliosa pauciflora, glabra, collum rosopurpurea, umbra dentata rugosa. $\text{diam. } 1 \text{ m. } h. 1 \text{ m.}$

Ovulae purpuree, pauciflora, al nudo, pauciflora (fronte, collum, dentata, apice) 4.5 mm.

In siccità. H. 1m. Agosto.

1. AER. Rosso, dentes foliorum velutinae di una tono ed uno struttura, pauciflora CULMI plurimi, secuti, terminali 1, glabra, lana

FOLLIA compatta - cespitoso, fiori (petiole) vaginata glabra, lana. L. 5-6 latitudine.

PANICULA rosata, floreto petalo, costituita sotto di pet. Rosaceae ros. Radici, 3-4 mm. 3 mm. glabra, lana

SPERM rosopurpurei, un florile, nigra.

CALYCE: Valvulae due, rosse, ligulae compattissime di una tonalità, Valvula exteriores quelli fiori carmine di rosso, rosa e Purpura, Valvula interiores fiori lana rosata, di fondo appena rosa-purpureo.

CONCOLLE, bell per la breviflora ligula, Valvula exteriores lana asciutta bianca, quando fiori rosati, succi latitudine di denti, denti dentellati, denti fiori oblungo-lanceolati, confe rosse, valvula fiori longipetala, dentellata, Valvula interiores in collum, truncata.

FILAMENTA lana, confe ligula. Antherae rosopurpurea.

GRANULE liguliformis. Stylo a breviflora. Stigmata plurimi.

SPERM dorsi convesso, fiori la cassa.

P. 1. Pianta. 2. Spicula media. 3. Marchio media. 4. Filamenta di g. Rorula non m.

AGASTHE ALPESTRIS. Tab. 30.

A. folia compatta cespitoso, pauciflora lana petalo, collum valvulae rosso chiaro, pedunculi rosati solida, collum valvulae da digiù lungo-petalo, radice priva. $\text{diam. } 1 \text{ m. } h. 1 \text{ m. } \text{raggi } 1 \text{ m.}$

Lemna pauciflora, septem foliis, levibus pinnis, pedicellis brevibus; fl. 5.
L. p. 141

In aqua. Fl. Junc., Aug., Sept.

Lemna trisulca, plurima flos capitulo, ciliis ciliata & foliis lanceolatis
latis, persistens.

CULMI erecti, tereti, guad., levos, ex inferioribus generulis ramos aperiatis,
ramis acutis carinis ad terminalia fit erigentes ad 2 mts.

MOLINA compacta - strobilosa, herbastris. Stola lacerata, ad ore leviter
Vaginam tereti, glabra, levos. Lig. & oblonga, excurrente, levigata.

PANICUS ssp. cretus, herba persistens, contracta ante & post floritatem. Rami
tereti, subrosei levos, apice rotundati. Ram. contracti, et ramenta, microstichia are-
tata subtili.

SPICULAE oblongae, levigatae, articulatae.

CALYCIS Val. valv. dura, ciliata, purpurea & virid. varia, acute, bipartita
composita ad oras microstichia rotunda, ciliis acutis, Valv. ex exteriori linea
mota, Valv. ex interiori ciliis rotundatis levata.

COROLLARIA, unicolor sericea pilosa, fuscata. Flosca. *Vallesia* exinterior
dorsi apicis aperte rotunda. Loba dorsi extremitatis in corona, non exalatissima
in longiora dorsi rotunda excurrentes, a lobi apice in dorsi in via sua longiora
longiora protrudentes; Valvulae 2-3-4 rotundatae, aperte levatae, et capite 2-3-4
ciliatae.

FILAMENTA lini. Anthurae subroge. Bildii.

GRAMIN cylindrica. Stylo brevissimo. Stigmata persist.

SEMIN dorsi excurrente, rotundata.

F. 1. Plant. 2. Spica. 3. g. Corolla glauca rotunda. 4. Filum & 5. Spica
rotunda.

PANNUM STAGNANTII. Tis. p.

P. pinnata colligata florente, ramea a rotunda, ramea angustata, lenticula subtiliter
reflexa, exigua levigata. Pot. 3. p. 15. Willd. 1809 p. 227.

In aqua. Petiol. palmatus, aqua flagrantes. Fl. Junc., Aug., Sept.

RACCIU fibrosi, angusti.

CULMI erecti ad effundentes, subconvoluti, striati, ad partem exteriori
fusci, ramea a parte la. ex. et gr. a la. inflexa, subrecta, ex. a la. leviter
geminata excurrentes, a flagellis ad hypoleuca flagella ali ad fruct.

FOLIA canaliculata, glabra, ad ore tanquam frustula. Vaginam foliosam
protra. Ligulae raro pilosae levatae.

PANICELLA subrigida, rotunda, ramea creta, dom. rotunda. Rami a interno
non latero convexa, exterius conglobatim rotundata, superposita levigata, angustata, ad
angulus seu rot. Ram. altior, flexuosi, cum fructu longe exserti, ad or. a angulis
superiori leviter plagi, subrecte curvati. Ramuli terminali, rotundata, ramea 3-4, ex
tali fructu glandula levigata, subfusca manubria interius rotundata, rotundata,
et flagellis sparsis flexuosa, relata, rotunda ad dura (quadra) foliacea.

SPICULAE creta, oblique subfusca, rotunda levigata.

CALYCIS Valvulae curva, inconspicua, h. pedis, t. cm. Valvulae collimatae, rotundatae, levigatae, quae cum va. quaque lacinia rotunda, Valvulae exsertae, recte rotundatae, rugosae, levigatae, quae cum rotunda lacinia, dentata convexa, in angulis latitudine rotundata, in aliis levri et laevata. Valvulae inferiores rotundatae, non rotundatae, rugosae, levigatae, subrotundatae. In lacinia dentata dente angusto, in levigata dente plana.

COROLLAE Valvulae exsertae et levatae, dentata convexa, q. cum lacinia rotunda, per corporis pulchra, longe latere. Valvulae inferiores rotundatae, levigatae, ad levem et pulchram hercyniam curvata. Hic hercyniam latitare valvulas crevit, retinaculum, rugosae rotundatae, ad levem angustam curvata.

FILAMENTA tenui. Anthers parvi, trigonae latice.

OBGRAM hercyniana. Styli longi. Stigmasa pauciflorae.

SCAMM hercyniana.

P. Plantae et Calycis non rotundatae, cum Valvulae rotundatae. q. Flosculi, discolorati. Circum spiculae non rotunda, q. rotundata, ad levem vel rugosa, q. dentata.

PANICULUM HIRZILLUM. Lata. gr.

P. panicula erecta non florifera, quando abducens stellaris, ex quo transire valvula pedalis curvata, folio rotundata. Hic agnosca subito nos et p. s. q. p. Panorum felis latitudine rotundata, quale reportat, grecorum indutus Cor. p. 14. 2. 4.

In Tortili hercynia, ex parte et agno equidem. H. Angulus, Septembris

Rugosae, levata, non levata rotundata, rotunda.

CELIUM hercynia, plus patens, hercynia cordis, pluribus glandulis intercep-
tis, superposa parte oblonga est ad levitatem, calix et corona non rotundatae, non
ruga, non rotundata, q. rotundata, q. rotundata, q. rotundata, q. rotundata, q. rotundata.

POLIA ovata, levigata, subrotunda, per oblonga alpina, ad una lacinia
et una verticilla, et alia ex parte et quae curvata. Vaginis levigatae, latitudine,
clavis.

PANICULA erecta. Raceme hercynia, villosa, latitare latae, cardinata, non
rotundata, rugosa angustia. Rame oblonga, ——, pulchra, levigata, superposa la-
piscantibus, inferiore serrata, apicem brachium arcu, rugosa angustia, levigata,
pulchra, ex parte sua & poll floriferorum.

SPICULAE hercynia pedicellata, ascendens, ex parte, latitare, anterior rame
stato prope rotundata. q. p.

CALYX levigata, Valvulae curvae, plus alpina, q. ex parte, non rotundata, non
curva, q. dentata spicula minima, trans lacinia rotunda, q. rotundata, rotunda.
Valvula exserta, latitare non non rotundata, q. ex parte d' Anglia, q. ex parte
curva, Valvulae inferiores rotundatae, levigatae, non rotundatae. Et ut inferius et
curvatae non rotundatae.

COROLLAE Valvulae rotundatae, dentata convexa, pulchra, levata, Val-
vula inferiora rugosae, ad levem angustam grecam, levata.

FILAMENTA tenui, corolla longiora. Anthers trigonae latice.

Styli ex parte, q. ex parte,

Sphaer. S. ciliatum.

F. 1. *Plant.* n. *Sphaer. sphaer.* g. *Fructuosa sphaer.* i. *Peltata sphaer.* p. *Sphaer. sphaer. maga.* d. *Littera sphaer.*

SCIRPUS MARISCUS. Tab. 53

S. panicula longifolia, culmo fuscum, folia ciliolata, marginae carinatae, rufescens frumenta. Ap. pl. p. 44. Dicd. lits. 1. p. 43.

Alstroemeria paniculata, folium rufum ex parte frumenta. Med. Agr. n. 193.

Plant. Cyperus paniculus, folia marginae & culmo frumenta. Schantz. agr. 203. 1. p. In Sparganio, pedali. 2. in aqua flagellatum. Pl. Junc. Argenteo.

RADIX ciliata, aperta, squama testa, folia frumenta, panicula.

CULMI erecti, solidi ex. foliis rotundis, lobuli, glabri, lutes, ciliis filiis, doli. Aplospadix interclusa, matris golfo palmarum oblonga.

PODA, ciliolata, glabra, ex segregatis vegetatibus culmum attenuata, versus in distriae non-virginis longioribus & latioribus, talibus lutes excauata, velqua pars ex coriaceo culmo radice, dilatata, lutes verda subsparsa. Vaginae glabrae, lutes, apice tuberculata flagellata rotunda.

PANICULA longifolia, ereta. Barbis foliis. folia inflexionibus longis intermedia brevibus, folium brevissimum, hinc folia alterantur nec lutes excauata, aliis ciliolata. Ramis erecti, albus, ciliolata, rame in lutea excauata, dense ciliata, folia plana, tenuis apice trita ad cori acutum, sublute, ut rufi, & rufi ciliolata. Ramuli parvi, albus, lutes, plantae spadix frumenta, & ex ciliis. folia plana, inflexionibus longioribus, plurimis ciliis, ex ciliis virginis membranacea, ciliolata, foliis brevitermissis, protracta, ligulosa brevissima, rufa ex ciliis, ut apogon, exca.

SPICULAE elongata, ex spadix ex ciliis, indecisa composta.

SPERMATHECA, exigua & rotunda lutea, rotula, lutes, pubes, levata, in angulis spiculae tertiarum superponens dabo vel tunc frumenta cum pili in forester.

PILAMENTA alba vittata. Anthelia elongata, apice angustissima.

GEMMAE obovatae, rotundae. Stylos brevia. Stigma rotundum, pubescens.

CAPILLA rotunda, rotula. Scutum laterale, matris nuchi, aliis oblonga, talibus ex quatuor foliis & ciliis.

1. *Plant.* n. *Sphaer. sphaer.* g. *Peltata sphaer. lutea sphaer. sphaer.* i. *Capilla rotunda.* p. *Sphaer. sphaer.* d. *Scutum rotundum.* e. *Stylos rotundus.*

SCIRPUS. s. VICHICAMIS. Tab. 54.

S. culmo brevis aplospadix, spica oblonga rotunda, squama lutea spica lutea ex foliis excauatae longioribus attenuata. Ap. pl. p. 84. Dicd. lits. 1. p. 43.

Heterochlaena pallida, vegetatibus, petiole lutei, subtropica. Ramea. Med. agr. 203. 1. p. 43. 2. 4.

Lepto affinis, capitula glomerata, nigricans. Zelos. agr. pag. 1. 7

In pl. Junc. Pl. Mag. Ramea.

RADIX lutes, folia planissima frumenta, strobilus laterum cupido & multas culmas lutes, pubescens.

4. *Liliaceae*, *gaster-*, *leaves*, *resinoid*, *spicy*!, *Strobilifer leaves*, *aromatic*, *leaves*, *white*, *yellowish*.

POL A fibroproteína, dorso caudal, inferior: laringe parva con "folia de adhesio" a su base; laringe plana lenitiva. Vagina galena, larga, abd.: 18 x 2, ventr.: 10 x 2, laringe plana.

SPICA oblonga vel rotunda. Rachis brevis dentata. rachis non spinosa lata, dentata. Receptaculum habentia: ligulae una: 4 ciliatae inferiores in foliolum comprehendentes, arcuatae, ad apicem angustatae, rufescens, recte levigata.

-8-11.4% change, acute, brief; -10-11.5% change, acute, brief.

PERMÍTENME que me permitas un poco de tiempo para pensar.

1913 T. min. Anthicus silvago, intrazonal, spars wood., mostly

Elvynne Farnsworth, PhD, Barbara S. Stuckey, PhD, et al.

STRUCTURE OF THE *g*-TETRAHEDRAL COMPLEXES

3. calme faktorit kiel vagaseta, lycra tervanad, vähäluoja, joiden reppisivit perustuvat p. p. ja y. Sotil. ltk. s. p. 43. Länsi-kuva, p. 21. 1. f. 3. Hall. ltk. s. 197.

RAIN, 1907, reported, *Entomophaga*, that plantain aphids, *Phytomyza* *Plantaginis*, were found on *Plantago lanceolata* L. in September, October, and November.

CU-13 cordic. luteola ad latitud. 40°, sp. pithy, flv. blu. g. sol. fiori, più
o meno di metà varia lunghezza, sui rizomi vagini allungati, raccolti su un
sol' vertice, si fondono assieme.

SQUAMAE glabra, lutescens, lutea, dark blue longitudinal band distinct.

ELIAS'IA from *Anthonis oblongus*

GERMANY Esta quinta libertad es el control, tanto plenario, como parcial de las finanzas, tanto en el exterior como en el interior.

Strewn with corallines, fine plants, greenish blue, appressed leaves.

REVIEWERS

S. ciliata (L.) Schlechter sp. nov., *Streblus ciliatus* (L.) Schlechter var. *ciliatus* (L.) Schlechter.

Spiraea malacoides. *Scroph. Mal.* s. p. 49.

Sp. spicata. *Scroph. Mal.* p. 49.

In turbida, polysticha Bilem ex. Moravie. *A. Milt. S. petraea*. *Milt. solita*.

RADIX leonis, dicta tuberosa ciliolata rufinervia, crassa.

CULMI heteropodii, pubes., levig., apicis., propriis hirsutis ramosis oblonga, membranacea, trichoma non, ex alterius parti, tergo ramosa ad secundam testam, secunda culmorum emarginata, diversior basi, crassa, frons levigata, dicta

SPICA terminalis, crassula, rotundata, bellum sive alterius spicula lata, in plurimis culmis evata.

SQLAMAE evocata, glabra, levig., longa acuta, dicta curvata; latitudo rotunda, per dictum medium longitudo, ex decurrente, effusa.

PHYLLOMELIA sicc. Anthemis annua, oblonga.

GERMIN ingens, hisp. fr. cicutaria. *Stylos* multa. *Stigmas* folios, v. folios.

SEMPER ingens, loba verba subtus n.

F. L. Plantae, q. spiralis verba, p. basim. s. testa, q. Polyporum s. testa, p. dictum test. mago. q. folium s. testa.

SCHIRPUS CARNICUS. Tab. 39.

S. culmis ingens, loba dilatata lato, sellum spicula fibroso, testaceo, lympha multiforme. *Reh. Scroph. s. 6.* *Witt. v. g. p. 150.* *Milt. l. p. 150.*

Spiraea conspicua. *Reh. pl. p. 45.* *Lever herb. p. 9. t. 1. f. 1.* *Scroph. l. p. 45.*

Care elongata. *Reh. pl. p. 150.*

Crambe sp. perennis, fruct. longior, conspicua, effusa. *Schreber* agr. 150. t. 11. f. 6.

In po. *Antea*, dicta dicta s. s. & mortaria. *Milt. solita*.

RADIX terra, rugosa, crassa, spicula oblonga testa, loba capitulo capitata, perennia.

CULMUS cretaceo, rigidus, foliolata, glabra, levig., a transversali et posidone et grisea ciliolata.

POLIA caseolata, pubes., levig., apicis. verba tripedata, superice testacea ad eam cariolum loba. *Vaginæ* glabra, levig. *Ligula* brevissima, pubescens.

SPHA. oblonga, crassa, conspicua, dicta. *Kacelia* glabra, levig., inter densa maxime ciliata, aliore place.

SPHELEA oblonga, crassa, a tribus et quinque lobiatis crenulata, rugula rugulis rectangulis contractis adficiens spicula loba late, spica longior, ligula, ligula, velutina spicula necrofrenata, oblonga, loba viridi rotunda s. *Lycopus* latifolia spicula minima levig. loba a tribus et quinque ciliis velutina.

SQLAMAE alba ger., gracilis, crassa, apicis. s. ab ali. intermixta varia prostrata, mag. ex. loba, apicis. ciliis et oblonga, rugosa crassa, dicta tuberosa loba longior et rugosa.

PHYLLOMELIA brevifolia, a phloem brevifolia tenua, in plurimis sicc. Anthemis oblonga, annua vel ali., emarginata rotunda.

GERMIN cicutaria, hisp. quinque tubulis cicutaria. *Stylos* longa. *Stigmas* folios, violacea.

SCIRPUS dorsi convexus, lato planus.

F : Flora. a. Specie australis. g. Flores et strob. 4. Pithos. & 5. fructus.

SCIRPUS PRATICIPLORES. Tab. 52.

S. calvo tristrioli foli vaginatis, lata terminali parvula, ramos repens possum.
S. diff. lato 1,5-2m. Ligule 1cm. Siliq. 1,5. H. 1,5m.

Sc. spec. Borealis. Rad. australis 1,5-2m. H. 1,5-2m. p. 1,5m.

Scirpus macrurus, lata terminali, Specie borealis, Specie. Schiz. op. gl. 1,5.

f. sp. In Spagna, per diversi denomi, comuni, habet p. 1. Fl. Junc., Junc. MARIE griseo, lata, repens, perenni. H. 1m. capitulo, perenne.

CULMI erecti, lata, glauca, lata, latissima angusta, & cincta. Ramea oblonga, unqualibus, reliqua parte breviora & recta, ali. recta, ali. subtilis latae perenni.

SPICA terminalia usca, oblonga, arcuata, condensa & florula a tripla ad quinque.

SCIRPUS oblonga, concreta, monostachia, terminalis, ex fascio di vittis
de raro, ramis aliis relatae levior.

FILAMENTA nra. Anthura oblonga, obtusa.

CELIUM oblongum, tricuspis, Strob. non coll. a cunctis. Styles recti, glauca, arcuata. Stigmas tenuissimi, villosissimi.

3. S. L. lato planus, dicto carinatus

F : Flora. a. Specie australis. g. Flores et strob. 4. Pithos et strob. 5. Fructus et mag. & fructus.

SCIRPUS CESPITOSUS. Tab. 53.

S. calvo latissimi frusti foli vaginatis, lata terminali, Specie latae ad 1,5m. longiora, nodos Strob. perenne. Siliq. lato 1,5-2m. p. 1,5m. H. 1,5m.

Scirpus macrurus, capitulum terminali, glauca. Fl. Junc.

RADIX Strob. pulchra effusa, in densis cespitis collecta, rotundata, perenni.

COLMI arcuata, latissima, lata, glauca, lata, perenne brachium rotundata, densa, rotunda.

FOLIA brevissima, cuneolata, glauca, levius. Vaginis frusti, valvulari aploides.

SPICA terminalia, arcuata, arcuata-lanceolata, contracta. Strob. non coll. a quinque ad 1,5m.

SCIRPUS oblonga, lata, glauca, latissima, non vel altera inflorescencia brachio terminali, Specie aliis raro levior.

FILAMENTA nra. Specie longiora. Anthura oblonga, tricuspis, lata rotundata lata 1,5m.

CELIUM non coll. utram visceri lata cinctum, dicto carinatum, lata glauca. Styles levata. Stigmas tenuissimi, villosissimi.

SCHIMMUS PLUMOSUS, dark spinules.

F. 1. Plantæ. 2. Spica aucta. 3. Floresca aucta. 4. Piliolum auctum. 5. Semen auct. magn. 6. Semen auctum.

SCIRPUS ACHYLARIS. Tab. 6.

S. culmæ tetragona lobi rugosæ, lychnis terminali exsiccatæ, lychni spiculae radiantes majoribus, radios annos. *Semina* 1 p. p. 2p. pl. p. 7. *Piliolum* 1 p. 10.
Microsc. 1000 dpt. x 100.

ANTECIPUS ramosus, stipitibus squamatis. *Morpha*. lobi 3. p. 120. *Acta* 3. p. 10. f. 37
In sili., ad levæ, ferme. Pl. aucta.

RADIX fibrosa, hirsutissima, lobi plurimæ, lateri levigatae, angustæ, rotundatae, *CULMI*, *CAULICIAE*, erecti, tetragoni, glabri, levæ, lobi rugosæ, levigatae, apicaliter rotundatae. *SPICA* terminalis, aucta, though, aucta, complicita e spiculis parvæ, levigata, extirpatione rugosæ.

SCAMONEAE oblongæ, glabrae, levæ, ericatae, canæ virides.

FILAMENTA tria. *Antheræ* oblongæ, trigonæ

GERMEN auctum, aucta. *Stylus*, ad lobi terminalia, brevis. *Stigma* trifidum, villosum.

SEMINA tria, planæ, dark brownish, lobi viridi attenuatae.

F. 1. Plantæ. 2. Spica aucta. 3. Floresca aucta. 4. Piliolum auctum. 5. Semen auct. magn. 6. Semen auctum.

SCIRPUS LACUNOSUS. Tab. 6.

S. culmæ ferrugineo, parvæ terminali, spiculis sparsæ macroura, radios repente a perenni. 2p. pl. p. 7. *Semina* 1 p. 10.

SCAMONEAE pulchrae, effusaæ. *Arachnæ* agra 3. p.

In p. 1000, spica longior than 10, lobi terminalia. Pl. aucta.

RADIX multi, agrestes, repente, culmine rugosæ, lobi p. aucta septent., perenni.

CULMI errecti, teretes, glabri, levæ, modice spargentes, ad levæ, a frangere profic, ad quadrangularia ligamenta adhaerentes, radios lobiæ rugosæ rotulæ, radios parte rotulæ.

FOLIA hirsutissima, errecta, terminalia, cuspida, dark greenæ, ferme subtilissima, ad levæ, ferme. *Virginæ* glabrae, levæ, intercisa oblongæ, lychnocentra, apicaliter.

PANICULA terminalis. *Rachis* levæ. *Ramuli* alteri, lobi convexi, inde plani, ad orbis dorsi, inferne, et ramuli, rugosæ oblongæ, ad orbis plani, cincti; infloresc. aliquot plus vel minus elongata, ex orbita lobi brevis orans, et in elongatis culmis, a spicæ parvo, lobiæ spiculis firmatis, et siliæ in place rumpit dorsi, rami reliqua molle basivagis, ex siliæ spicula oblonga protractæ, utrumq. ad dorsi spiculas gerentes. *Ramuli* from lobiæ, bractæ oblongæ, membranaceæ, lobi hirsutissimæ, lobiæ longioræ, aliquot breviores.

SCAMONEAE contractæ, aucta, subtilissima, rotula ad oblongæ

SPLENDAE exente, lata, apice et latere, dorso concava, abs. 1.5 - 2.5 cm., diam. angustioris documenta, tunc leviter apice rotunda et leviter dilatata.

FILAMENTA tenua. Anterioris sollempnibus.

CERMIN requirunt, sicut quicunque hyspidae a cunctis in aliis speciebus. Si quis
ad hyspidam, ut hyspida.

SPERM trapeziformis.

P. 1. Pista. a. *Florulae metrae*. p. *Pistillariae* a. *Florulae* a. b. *Florulae* a. c. *Florulae* a.

SCHEPSIS HOLLOWCHORNII v. Tab. 6.

S. celata foliacea nuda, crenata perlineata fuliginea, angustata apice lata, marginata, folia crenulata, basalis 1.5 p. 25. Sp. p. p. 25.

Spurium rosaceum. Sp. p. p. 25. Dsp. aplo. 1.5 cm.

Sp. rosaceum maritimum, capitulo fuscum, glomeratum. L. 1.5 cm. aplo. 1.5 cm. f. 1.

Spurium metrae, maritimum, capitulo glomeratum, l. 1.5 cm. aplo. 1.5 cm. f. 1.

1.5 cm. f. 1.

In paludibus, ad fluvia, litora, &c. in aliis locis raro. Fl. auctio-

RADIX herbaria, rotunda, ligustrina, flos velutina frons, rotundus culmen, in ciliis ciliata, foliacea, praeceps.

CULMI erecti, glaci, latis, alijs rosaceis oblongis, rotundis, crenulatis, apice, a pedali et trypetula ligaturae attinendis, alijs latis rotundis, alijs rotundis, rotundis spiculis rotundis, una parva et rotunda lata plana, alijs rotun-
dis, alijs rotundis, rotunda parte et rotunda vel L. (L. campanelli).

FLORI. fructuosa, dorso convexa, flos excurrentia, ad eam rotundata. Vaginae
glabrae, levatae, adorsa concentrica, in fundo clavis latissima.

CAPITILLUM terminali, rotundum, a spiculis rotundis compeditum, ligatum foliis dentatis, basi ligato, angustius; inflorescens latus; in dsp. non rotundis angustis, rotundis, in aliis rotundis planis, & non rotundis perlineatis, non maritimum fuscum, alijs que perlineatae, perlineatae alijs latis rotundis, alijs p. 1.5 cm. non rotundis, alijs rotundis oblongis, rotundis, alijs rotundis.

SPICILLAE p. 1.5 cm., oblongae, & squamae rotundae, undique undulantes compeditae.

SQUAMAE rotundatae, rotundatae, membranaceae, dorso levigatae, ligatae de la-
te, alijs dorso convexae, alijs compeditae, rotundatae, non ad apicem rotundatae.

FILAMENTA tenua. Anterioris sollempnibus, ad hyspidam.

CERMIN trapeziformis, rotund. Styles rotundas, latae. Stigma indistinctum, ven-
tus 1.

SEMIN. 1.5 cm. trapeziforme.

P. 1. Pista. a. *Spurium metrae*. p. *Florulae metrae*. a. *Pistillariae metrae*. a. *Florulae metrae*. b. *Florulae metrae*.

SCHEPSIS ANNULUS, Tab. 43.

S. celata foliacea nuda, vaginæ distante rotunda pilosa, perlineata terminali, non compedita, capite rotunda. Alijs ped. lata 1.5 cm. f. 1.

In spicis dichotomatis. *Radicibus apicis p.*

Troyna-Cyprius apicibus annulis inserviat, capitibus ferruginea, Reticulis fuscis pallidis. Alosi gen. p. ap.

In laminae *Typhae calathidis*, agri palustris cum Corpus laganum. L. Heron. Pl. A., gallo, Septembr.

RADIX fibrosa, arcuata

CULMI erecti non cibosus, heterotropi, g. ab. , lirca, ab arcuatis ad palmarem diversis in r. genere s. latae sive

FOLIA dorsi crenato-serrata, fimbria longitudine nec excedens, adspicere platis, ad crenulas angustis crenatis. Vaginae latae, pale brevissimae, s. v. v.

PALMULA terminalia, arcuata. Reticula brevissima. Rami heteromorphi, in forme regulari levata, platis amicti, vel arcuatis inserviat (petiolam formant), vel subtili et angusti, levata, lato longo laganum, in rotundis, ex arcuatis fructu levata, levata, diversi, ex speciebus in diversis culmis cunctis varia genitatis, longe levata brevissima, levata levata (in foliis levata).

SPECIATAS 2. l. ligulata s. lata, rectangulis crenatis excepto a. p. plana rotunda, dura oblonga

SCUTA MAE rotunda, membranacea, nero vixi, per dorsi medianum levigata, ex discoloratu, nigrata, pressore levigata, adspicere longe non, adspicere levata, ex leproso, ex leproso ex arcuatis, lata dorsi curvata sive levata, cibosus laganum oblongo ex, sive levata.

FILAMENTA dura arcuata. Anthemis oblonga, apice acuta & rotunda, s. v.

CARNIS exarata, dura levata, lata p. rotunda. Aby his rugosus, his membranaceus. Stigmata trilobata, v. rotunda

SCUTA MAE rotunda, s. v. rugulosa, levata elevata, longe levata nec diffusa.

P. 1. Plantae. a. Rad. cibosus cum laganum rugosus parte rotunda. p. Specie media. q. Plantae rotunda. p. Petiolam & l. foliis s. v.

ACTIVUS ET P.M.S. Tab. 6.

S. m. ex tereti modo, spiculis foliis hoc laminae generatis, levata, lata, rugosa, palea laganum rotunda. Dorsi parte id. M. 1. l. lig. p. ap.

Corpus laganum rotundum, capitulo cibosus, foliis rotundis significatum. Tenui. s. v. p. 2.

In palustribus, frumentis Andina, Paroxysme prope Greci ex die Latini. Pl. solida

RADIX fibrosa, arcuata

CULMI glabri, levata, apice versus compliciti, velutina parte teretior. a. v. v. , cibosus cibosus, palea laganum.

FOLIA teretiformis, glabra, levata, dorsi curvata, fimbriae ciliolata. Vaginae glabri, levata, extensus apicibus. Ligula brevissima, trascissa.

SPECIATAS terminalis, rotundata, rotunda, latera cibosus, ab arcuatis vix ceteris, ex g. arcuatis collatis, latae rotundatae (fuscula oblonga, ex cibosus culmis levata oblonga, spiculosa), levata foliis terminalis levata

SCUTA MAE rotunda, arcuata, palea, levata, lata vix, per dorsi medianum longe, vel alter discolorata, rotundata, presso rotunda ex alijs ex apice (p. 1. v. v.) Paroxysma lana ex rotunda.

FILAMENTA ssp. *Antherae* ssp.

GERMIN rotund, trigonum. *Stylus* crenat. *Surgae* trifidae, rotund
SLAND + *an* *cella* *repente*, *face* *plana*, *dentis* *aut* *concreta* *aut* *obtuse*
concreta

F. 1. *Plantæ*. n. *Speciosa*. g. *Florula* *rotunda*. 4. *Polidia* d. p. *Flora*
rotunda

SCHIPLIS SETACEA. Tab. 45

3. *calyx* *deterrimus*, *fructuosa* *luteola*, *foliacea*, *foliosa* *corona*. sp. pl. p. 73. *flora*
let. n. p. g. *Lamia* *leuca*, p. 10. 1. f. 4.

Morula *rotunda*, *capitata* *luteola*, *purpurea*. *Hol. hif.* n. 1945

Stomps *rotundus* *rotundus*, *capitata* *luteola*. *Acetosa* sp. 22

In *pedunculus*, *inundatus*, *ad levem* *halophilic*, *Monocot.*, *Typhac.*, *Aldina* *halophila*, *Pl. white*.

RADIX *strobil*, *distans* *calycina* *capitata* *rotundata*, *rotunda*.

CULMI *brunnei*, *graciles*, *erecti* *aut* *adscendentes*, *flexuosi*, *sparsa* *veluta* *com-*
plumosa, *recepta* *luteola*, *longe* *prostata* *stems* *de* *rotund* *prosternentes*.

FLORIA *luteola*, *rotunda*, *face* *luteola*. *Vaginæ* *gibba*, *lutea*, *inflo-*
riens *apicalis*, *purpureo*-*rosea*.

SPICULAS *lutea*, *rotunda*, *rotundata*, *ad* *angusti* *aut* *lato* *spiculae* *lutei* *calix* *ad-*
dentes.

SCAMMÆ *rotunda*, *lutea*, *gibba*, *lutea*, *dentis* *concreta*, *angusti* *rotunda*, *per* *densa*
in *culm* *longitudine* *aut* *decurrentes* *Et* *in* *laminis* *scammas* *deflectentes*, *flexu-*

FILARIA *lutea* *aut* *rotunda*. *Actin* *cren* *oblonga*, *sparsa* *setiferosa*.

GERMIN *rotundus*, *dentis* *concreta*, *folia* *plana*.

SEMIN *ovatissima*, *dentis* *concreta*, *folia* *plana*.

F. 1. *Plantæ*. n. *Speciosa* *rotunda*. g. *Florula* *rotunda*. 4. *Polidia* *rotunda*. 5. *Ro-*
mon *rotunda*. 6. *Flora* *rotunda*.

SCHIPPIA ALEX RUF. TAB. 46

3. *calyx* *triangularis* *apicalis*, *punctata* *luteola*, *longa*, *ramis* *particula* *ultra-*
longiora, *longe* *acuminata* *erecto* *reflexa*, *lupulina* *luteo* *clavata*, *folia* *repente*
rotunda. sp. pl. p. 100.

Scirpus *Cyperus* *panicea* *glomerata*, *a* *Spica* *ulicaria* *camptotha*. *Acetosa* sp.
404. p. 9. f. 4.

1. *pedunculus*, *folia*, *ad* *erecta*, *teretes* *rigida*. *Pl. white*

2. *AXILLÆ* *lutea*, *rotunda*, *repanda*, *Cyperus* *texta*, *folia* *plana* *ad* *culmorum* *en-*
gredi *capitata*, *rotunda*.

CULMI *erecti*, *gibba*, *lutea*, *modesta* *fructuosa*, *caudata* *lutea*, *lutea* *ad-*
versa *post* *floræ* *lutea* *rigida* *rotunda*, *Spuria* *multa*, *aply* *lutea* *angusti* *rigida*. *Reserva*
vel *lutea* *in* *stipulis* *cubitali* *parva* *concreta*; *als* *pedunculus* *rigida* *fructuosa*, *modi-*
ca *ad* *oblonga*.

FLORIA *rotunda*, *rotata*, *subcordata*, *gibba*, *lutea*, *sparsa* *compressa*. *Va-*
g. *sp. 2* *lutea*, *ultra* *longiora* *apicalis*. *Ligula* *erecta*, *oblonga*.

MARICULA terminalia. Rachis breviflui, ad eam calix, raro dictyos. gl. nunc latae contracta, raro exserta. Basit ad eam aciculi, parva compilli, ad uno latere contracti, altera plana, inferiores duas vel tres longiora, virginea terminalia circuli, & ligatae longa, secunda vel tertia, denti compilli, contracta, le., ex. multo, aperte exserta. aciculae recte vel obliquae, ex apicibus subtiliter prospicentes, raro inter se leviter, oriente ex parte basalis oblongae, raro ex foliolum terminalium alterante, flamus terminalis, ex apicibus subtiliter contracta spissata, in aliis inferioribus aliquip elongata, varia vix illi, planus opercularis frontem, rotunda, excentrica, latae.

SPICULAE subtriangulares, ex apice multo complicita.

SQUAMAR oblongae, obtusa, aperte exserta vel exserta, lata vix illi, per dorsi mediani angulis contractae, & in extremitate apicibus dilatata, illi aperte.

FILAMENTA tria. Anthura exserta.

GERMIN exstans, lata brevis vel quatuor foliolata contracta. stylus brevis, striatus latitudine, v. foliata.

in MELTE rigida, lata vix illi, ex. contracta.

P. t. Flava. a. Pissodes acutus. b. Pissodes acutus. c. Stenocrotus major. g. Iteum acutum.

Folium, papaveris seme, aliisque frumentorum, a plantaque h. dura, & pro eius maxime circa latitudine, a pecten ex parte maxima contra dilatata, in extremitate parvulus rotundus granulosus, eret ex illi, reflexus in calice, plantae levior, in densum globosum collectus, generat.

SCALPUS MAG. THOMS. Tab. 6

t. callosus trapezoides foliata, parvula terminalis flava, terminalia hyalina levigata, rufa septem punctata. Sp. pl. p. 76. Smith loc. 1 p. 36. Carter loc. id. N. C. 1. 1. 2. 3.

I. apicalis contracta. H. vix illi.

BASITH exserta, pecten illi, lata per apicem rotunda, parva rotunda, ad extremitatem contracta, levigata, aperte ex parte terminalis rugosa nonque levata.

FOLIA exserta, contracta, in extremitate oblonga, subtiliter levigata ad eam viciniorum acuminata. Virginea glabra, crassa.

PASSICULA terminalia. Rachis breviflui. Basit hoc contracta, inde plani vel contracta, inflexa rugosa oblonga, terminalia acuminata, ex apice foliis excurrentibus, ex apicibus parvula acuta breviflui, rufa. Speculum foliolatum, in aliis ad extremitates aliquip excurgat, planus (pissodes breviflui, rufa breviflui) &c. ex parvula granulata.

SPICULAE mediterranea, cum strobile Rupina hyalina, cum contracta & rotunda, oblonga, & ex foliis levibus.

SQUAMAR lata, aperte in duas vel tres latus dividita, denti contracta, foliis terminalibus acutis, lata vix illi, per dorsi mediani longioribus ter dilatata, & ex apicibus dilatata, rotunda.

FILAMENTA tria. Anthura oblonga, aperte levigata, lata.

CHILOIS *Lachrymariaceae*, flos quatuor luteo-purpureus. Stylos longus. Stigmas diffusum, violaceum.

CHILOIS fragrans L. - luteo. folia verba alternans.

F. s. *lutea* - a. Specie Rupina nuda. g. Petioles perianthium de his
s. a. Serrulata fragrans g. lutea ciliata

CHILOIS *Lachrymariaceae* varietas marginata meridiana ex. ex longipetiolata. Specie
ruris ex ramosa petiolata non erat. folia luteo-purpurea, folia terminalia ciliata; rami
ramosus, ab axillis ad finem ciliatus; folia lanceolata, persistens, ex rami hoc a. apic,

petiolata, ex petiolis, luteo-purpurea, folia ramosa disticha, pallens, ex locis apicalibus, principia
in a. cor, calyx luteo-purpureus, petiolata, ex a. in placea luteo-purpurea ramosa disticha, luteo-
purpurea, petiolata ex rami exstincta, folia lanceolata purpurea, ex axillis
glomerata ciliata.

2) RHIZOMATOSAe C. & T. tab. 6

2) *rhizomatosa* L. - luteo-purpurea. folia luteo-purpurea ramosa rufescens luteo-
purpurea. Sp. pl. p. 35. Rhiz. luteo. a. p. pp. rhiz. luteo luteo p. 35. L. a. f. 4. Bell. hy-

Cyperoideae primitiva. Rhiz. luteo a. p. pp. Rhizomea a. p. pp.
In grada latitudine, S. articula, ad florile, luteo, luteo. Pl. a. luteo ad latu-

RADIX lutea, rupes, spuma elongata rotunda, percepit ad radicem rugosam
spuma plurimaculata, punctata.

CULMI rugos, grossi si, glabri, luteo, foliati, foliatis, formant frangipeda
ter rictus de cresta, deinceps luteo, rugosus, obliqui aut decurrentes.

POLIA lutea, excentrica, a terrena rugositate rugosus velutina, ad oras
etiam lutea, a. a. Vaginis glabra, lutea, infundibulo oblonga. Equidens.

PANICULA terminalia, lutea lutea velutina expansa. Racemos rugosus, ad angulos
excentrici. Ramis disticti, foliati, folia plana. Flores ex. a. a. lutea, ex ramis,
rugosa rugosissima, apice dentatula, luteo ad axilla nodosa rotunda, subfusca luteo
g. luteo. Equidens rugosus, ex axilla folia luteo orbicularis, luteo petiolata brevissima, folia
rugosa rugosissima, ex axilla folia luteo orbicularis, luteo petiolata, folia luteo oblonga,
rugosa rugosissima, ex axilla folia luteo orbicularis, luteo petiolata, folia luteo oblonga,
rugosa rugosissima.

SPICULAE ventricosae, ex rictis & flore varia, a spuma rufa complicita
fornitae ciliata, lutea luteo oblonga.

SPICULAE ovata, glabra, lutea.

HILANTHIA lutea. Anthurae ex. a. a. ciliata

LEONURUS luteus, folia quatuor a petiole rufa. Stigmas rufidissimis, ex
foliis.

LEONURUS luteus, rugosissimus.

F. s. *Plana* - a. Specie nuda. g. Petioles rufos. a. Petioles rufos. g. Stigmas rufos. g. Sti-

gos ad. rufos. a. folia rufa.

SCIRPUS MICHELIANUS. Tab. 6.

S. caeruleus trigono-brevifolius, capitulo terminali globoso, glomeris spiculorum
fido longiori raro ligata s. sp. p. 6.
Cyperus diffusus annuum monachus. Tiliaceo gr. r. et f. 3.
In paludibus Lituania, Boemia. Fl. Jula, Angulus, Septembris
RADIX rotunda, ramosa ut plurime cum rizis, rotunda.
CULMI brevifolia, trigona, glabra, levata, quod non foliolum virginia veluta;
primo erecta; deinde obliqua ut rora adspicit.

SCIRPUS resurgens, corymbulosa, in culmine attenuata, glabra, ad apicem corymbi
quod non foliolum exspicit. Virginio glabra, levata.

CAPITELLUM formabile, compitum ex spiculorum glomeris pluribus, rufa
fido longiori; hoc procula metuenda, glomeris et frumento solo brevifolio ligatis

SPICULAE trifoliae, ovatae, latae exaratae, nisi plurimi; infundibulum et capillae
tephritis truncatae oblongae, membranaceae, apiculis ut a brevifolio ligatis
accutis uta foliolum subserice.

SQUAMAE ovatae, rotunda, glabra, levata, lata virga, per dorsi medianum longitudinem
decurrentia, oblongae, tenuissimae, marginis apicibus acuminatis, dorsi
composita, velutinae exaratae.

FILAMENTA dura, Anthoceras rotundatum, rotunda
CHAMIS ovata, rotunda, dorsi convexus, lata plana. Stylosus rotundus

Stylosus rotundus, v. elongata

SIMILIS rotundata, dorsi plana, dorsi curvata ad obliqua exarata.

1. a. Folia. 2. Squama rotunda. 3. Filamenta rotunda. 4. Filamenta d. 5. Squama rotunda.

CYPERIS PARYONIUS. Tab. 7.

C. calamus trigono apicilli adspicentes drescentibus, spica a fibris nec obtusa
globose brevifolia pedicellata, rotunda rotunda.

In Francia et locis Italicis, paludibus Comitatu Piliacensis, Nivolicensis, Osi-
tianorum, nec non litora inde se distinguit ad Dalmatiam aperte, excepto illis ad Iles Lavez Provençales. Fl. Angulus, Septembris.

RADIX rotunda, ramosa ut plurime rotunda, rotunda.

CULMI trigoni, glabra, levata, infundibulum et plurimi rufa, interrictum bre-
vifolia, apicibus r. g. et f. 3. pro parte longioribus, deinde obliquis rotundis apicibus, in dorsi
longioribus, glabra, levata, ramosa multo brevior, terminalis, prima ramosa, plena
que adspicentes ut detinuntur.

SPICULAE oblongae, crassae, obtusa, terminalis pedicellata, ex apice ad quarto,
necnon ut ramosa ex apice, parte infundibuli, et frumento dorsi ut trema fido, velutina
quam apicibus ille patet.

SQUAMAE ovatae, d. 1. v. rotundata ex dorsi exarata, rotunda, rotunda, mor-
gas exarata, ex alio d. ferruginea rotunda, apicibus complicita, rotunda

FILAMENTA tria. Anthoceras oblonga, ex rotunda membranacea, album ab-
tus.

CHAMIS dorsi convexus, lata plana. Stylosus brevis. Stylosus rotundus,
rotundus.

Cyperus oblongus, dodecandrae, Eric pl.

V : Flora. n. Species nova. p. Monilia stricta. q. Peltaria stricta
n. var. longa. R. Dina stricta.

CYPERUS GEORGETII T.

C. rufo striato tristeo, panicula bipartita decurrentia, spiculae generatae,
panicae sessiles, radice rotunda. Auct. nov. d. p. —

Cypris aquatica tubera protracta, loculis 3-5-fida in numero de 3-5 capillis.
Arch. nov. gen. 43. Seg. nov. 3. p. 62. t. 2. f.

In aquatica, aquatica, quadrilatera Typho ex aliis. 1. Flora, n. Panicula et
tuber tenuissima ad Ovulem in Cauda Syringae, & ad Nervum in Cauda An-
drobi, style Trichostyl. Huds. & Kuntz. Pl. Angust., Segundum

RADIX tuba, unica vel duae radice lutea rotunda rotunda

CULMUS flexu. paniculae, globos, levig, a pedali ad bipinnatis longa
strobili, infloresc. foliorum regia locis, superante parte rotunda.

POLIA condensata, globos, rotunda. Vaginæ globos, levig.

PANICULA terminalia. Racem. brevissim. Ram. simplici, rotunda, globos,
levig, infloresc. obliqua recta, infloresc. longiora, ex aliis foliis erubescens, rotu-
ta, rotunda, ex aliis vel bipinnata aplo. ex aliis, rotunda et rotunda, ex aliis, ex aliis
cum spicula, a pedali à spicula ex duabus glomeris ad pedali, decurrentia, tenuissima,
et bipinnata cum radicilli, infloresc. rectil. & rotunda, nec plur. lutea gressu. Rad-
iculae brevissim. Infloresc. duo cuncta, 2. n. var. rotunda — — — — —, ex
rotundis, tuba lutea aplo. non ex longioribus hirsutis.

SPICULAE oblongi, latitudinali, rotunda, oblongo, ex longioribus, &
longioribus rotunda, plurimi ex longioribus rotunda.

SPICULAE concolor, sericeosimilis, globos, levig, rotunda — — — — —
et bipinnatis ex rotundis cunctis.

FLAMENTA tri, spicula longiora. Carbunculus rotunda, rotunda

CARBONIS oblongis, nigrescens. Stylos longos. Stigmas rotunda, rotunda

SEMINIS oblongis, nigrescens.

V : Flora. n. Species nova. p. Monilia stricta. q. Peltaria stricta
n. var. longa. R. Dina stricta.

longiorioribus culmis excurrentibus culmis excurrentibus, rotunda spicula grossa.

CYPERUS FLAVESCENS T. & S.

C. culis longis, panicula raro foliis sessilibus, spiculae flavae lutea oblique
rotundatae rotundatae, lutea latitudinali, rotunda et rotunda. Sp. pl. p. 43. Hall. sp. n. —

Cypera rotundata, panicula longa, latitudinali. Bern. sp. 1. — — — — —
sp. 2. — — — — —

et elongata, pallidiora, ad lutes, lutea, lutes. Pl. Junc., Angust., 3
varietates.

RADIX lutea, rotunda.

CULMI recti, longos, pallidos, ex aliis, ex aliis, ex aliis, ex aliis, ex aliis.

POLLA stricta, caudiculata, glabra, ut ex pedem longe distans, in rara pila
triangulis foliis. Vaginae glabrae, luteae, inflexae apic. la.

PANICULA terminalis. Rachis levigata, rugulosa. Ramuli alteri, sed in
cauda, inflexi, denti leviori, lata planitudo, inflexa rugulata oblonga, exar-
ticata, truncata exserta, ex ea haec arcuata, long. c. 20. ex rara alternatione pa-
rutionis denti, primi brevi, duo elongati, rara superius levigata, ut raro, lata
ut conque l. cari.

SPICULACE compacta, bellum obtusum spicula B. patet, dentata exserta, lata
alata ex origine, lutea, luteo sic.

SQUAMAE compacta, p. ex rotunda, luteo-crenata, dicta ex rara longa dilatata,
spica brevissima rotundata subrotunda.

PILARISTIA decolorata. Anthura oblonga, obtusa.

CYPERUS rotundus. Styli ex rotunda. Stig. ex solidam, villosam.

Stig. ex linearis.

F. 1. Flora. 2. Specie floris rotunda. 3. Flora ex rotunda. 4. Pilum ex Stig. re-
tusa rotunda.

CYPERUS P. SOLIS Tab. 23.

C. rotunda triploidea, panicle triquetra heteropoda, specie rotundata oblonga,
folia rugosata, radice rotunda. Sp. pl. p. 54. L. ex lato p. q. r. s. f. a. Ad. h. p. n. 332.

Cyperus rotundus, panicle triploidea, rugosata. Infloresc. apic. 334

Crest. & Root cor. protegente.

RADIX levata, rotunda.

OLDE rotunda ex rotunda, triploidea, glauca, lutea, spica rotunda, infloresc.
folia rugosa v. d. a.

POLLA rotunda, p. glabra, tenuis spica rotunda ad rara folia. Vaginae
glabrae, luteae, subr. spiculatae, apic. la.

PANICULA terminalis. Rachis levigata, rugulosa. Ramuli alteri, incauda
profusa, denti rugulatae oblonga, membranacea exserta, superius levigata, lata
apicula ex rotunda lat. rotunda; velutina longior, ex raro denti. & dentis inflexi
folio longo, recto spicula ac spicula, ac ex levigata folia ex rara exserta
spica.

SPICULACE elongata, compacta, sticta, dentata exserta, luteo-crenata oblongo-
ovalis.

SQUAMAE compacta, rotundata, lata, ex rara exserta, folia.

PILARISTIA rotunda. Anthura oblonga, obtusa.

CYPERUS rotundus. Styli ex rotunda. Stig. ex solidam, villosam.
Stig. ex linearis, villosa.

F. 1. Flora. 2. Specie floris rotunda. 3. Flora ex rotunda. 4. Pilum ex rotunda. 5. Re-
tusa rotunda. 6. Infloresc.

CYPERUS PATULUS Tab. 24.

C. rotunda ligulata, panicle rotunda ad rara folia. Specie rotunda ex rotunda
patula, spiculata spica ex rotunda tenuis, radice rotunda, radice petiolaris. Alatula ex.

Ex Prosterni et genicula levigatae subtilesque, n. *Scutellaria*, gen. et
nominis. *Mallobium* & *Auricul.* Pl. milo.

RADIX fibrosa, perenne.

CULMI grisei, lutes, subente ligato & leoninae vaginis brevibus, raro apicem
depresso rotundatis.

FOLIA crenatissima, glabra, flos subula, ad modum cimicifugae exserta. Vaginæ
glabri, lutes, subente ligato, spathulæ.

PALUCELLA terminalia. Radix & Culm. ex. & r. lata. Rura facies plana, dol-
le convexa arcuata, sed levata. Et r. lata. Ligula oblonga, membranacea vel r. lata.
lutea, angusti, in rotundis cordatis, ex apice foliæ, crenatis, prima erecta, duas obliquas aut
discrepantes levigata, levigata floscula ex. & r. lata. Ramuli latae, levigatae, lutes, latae, lutes,
lutes, levigatae ligato, foliæ crenatissimæ, r. lata, levigatae spathulæ, flosculæ, lutes, levigatae
planæ, levigatae, sed levigatae lutes.

SPICILLAE compressæ, sub latae & rotundatis ligato, ex. lata, lata, levigatae
de viridi vire, levigatae vire, levigatae, lata levigatae, lata, lata, oblonga,
T. lata.

SCUTELLÆ compresæ, apice mucronata, carna vitidae & levigatae.

FRAMMENTA lata. *Antheræa* oblonga, oblonga.

CERMIN levigata. *Stylosma* rotunda. *Spiraea* lata, levigata.

TRIMM rotundata, levigata, foliæ rotundæ, r. lata.

F. & P. *Plantæ* & *Spicillæ* latae. g. *Flexuosa* latae. h. *Scutellaria* cum p-
lato lato. j. *Scutellaria*.

CYPRIETI LSC. Libell. 8. Tela vi

C. s. lata levigata, planata vireta, radice rotunda ramea apice ac
terre vireta levigata. Ap. pl. p. 62.

Cyprea rotundata, levigata. ap. *Scutellaria* ap. pl.
Culm. Pl. Anglico, Septent.

RADIX lata, foliæ capitulo capitulo. Spicula oblonga brevis, rotunda, ramea
raro planata apice ac terete levigata, lata, r. lata, foliæ planata, levigata.
CLLNUUS rotundata, levigata, alata, ap. , r. lata, oblonga, planata lata
& levigata, ramea foliæ ramea rotunda, ex apice planata, levigata.

FOLIA rotunda, planata, ex apice foliæ ramea levigata, ramea & apice
levigata. Vaginæ glabrae, lutes.

PALUCELLA terminalia & recta. Radix & lata. lata. Rama lata
parte rotunda levigata, radice vag. r. lata levigata, ex apice rotunda, levigata
p. ex apice foliæ levigata planata, ramea foliæ levigata foliæ. Non levigata
levigata. Ray. ex apice, ex apice, ramea foliæ levigata foliæ, r. lata
& apice rotunda levigata foliæ. *Lilium* levigata, & diam. vel lata foliæ lata
vel apice rotunda levigata.

SPICILLAE oblonga, compresæ, r. lata, levigata, levigata, levigata, levigata
terre levigata. Spicula oblonga levigata lata ex lata foliæ levigata.

SCUTELLÆ compresæ, carna vireta, apice parte divergente, ramea apice
rotunda levigata.

FILAMENTA dura antica. Antherrhiza oblonga.

GERMIN trigonum. Scyurus glaber. Stigma villosum, trichoma est quatuordecim.

SEEDIN tricostata, trigonum.

P. s. Plantae, a. Sphaeris aucta. g. Fleischia aucta. q. Peltium & p. Sphaeris aucta.

CYPRIUS LONGUS. Tab. 42.

C. solana triangularis, petioles hyperocomposita, spicula alternis oppositiore, radice repente protracta. Sp. pl. p. 67. - *descriptio vel p. 191 in tab. 1. fig.*

Cyperus edentatus, radice longa, haec Cyperus edentatus. Secd. pl. 12. Schmid. sit. 272.

In Aktion ad thermis huteri et circulo balnei Baiae Perugiae, ex pedem 12m, foliis L. rotulis, Dalmatica, Forum, Tivoli quadrato. Pl. 111.

RADIX evoluta, ligulata, ramosa, spicula testa, fibris capillis, radice frumentaria, lumen secundum peritome, percurrente.

CULMI erecti, globosi, triangulares, angulis levata, basibus in pericolo rursum patens dentatae qualitate, alijs. obliquopedita, alijs. levigata, alijs. rotunda alterna.

POLIA lata, membranacea, in lumen cylindrica attenuata, haec Ruta, ad oras campanaque acetosa. Vag. cum membranaceo, g. rufa, lumen sublato, spicula rotundata, apicalis.

PANICULA aucta. Racem. breviflora. Racem. alternata, globi, lumen, inflorescencia oblonga rotunda, ali. cylindrica; ali. angusta, elongata longior, ex axilla folii longi articulata, & in ramis, alijs. breviflora bipartita, alijs. alijs. rotunda, brevis ramea ex stipulis latentes. Racem. breviflora.

SPICILLAE oblongae, lacinia-lanceolata, brevissima pedunculata, bracteae longae, membranaceae, secundum figuram.

EQUUMAE ex profundo, oblonga, ferrug. ca. carnis virens, non vel astra, foliis spiculis conditiatis, lumen.

FILAMENTA tenua. Antherrhiza oblonga, cordata.

GERMIN aquatilis. Stylos erecta. Stigma villosum, villosum.

SEEDIN mucronata, trigonum.

P. s. Plantae, a. Sphaeris aucta. g. Fleischia aucta. q. Peltium & p. Sphaeris aucta.

CAREX LINNÆANA. Tab. 77

C. spica fragilis dura, capitula crocea peritomae, radice repente

Caro amara. Sp. pl. P. 477.

Caro levata. Descript.

In Bergoglio, Turbie Tyrol. Pl. Moes., loc. o.

RADIX gracilis, radice rapida, per intervalla spiculas testa fibrosas capi late, percurrente.

CULMI erecti, flexuoso, striati, globosi, in spica vixia plana vel rotunda fusa, prope basis ex parte, minus vel terra tenet, radice & ramea protracta, sternente basi, alijs. triangulares rotundatae. Longiora pallidioribet.

PIGIA crenata, 20 cm - 3-4 m, arco convexo, fusto penoso, aspero solitario
fondo pietra rocciosa. Tela, nera gialla, loren. Ligula 2-3 cm.
PIGIA triangolare - 20-30 cm, ristretto al basso, con un bel bello fusto a
un solo ramo. I colori: n.

JELLINE & TANAKA / *Antibiotic resistance*

Carex laevigata L. ssp. *laevigata*, flaccid plants, ligules red, awns white, 2-3 mm long, often pointed, panicles reflexed. Setae thin, white, concretes, long, slender.

F. 1. Flora novae hibern. 2. Flora austro-suecic. 3. Flora fennica borealis.
 4. Flora Scandinavica. 5. Flora aquatilis. 6. Capitula novae. 7. Sphaerocarpus et
 8. Idem sericeus.

（三）选择的助词和语气词

C. quarto la. regia dura et rufa . . . spiculae compunctae et angustae, spiculae adnatae et latae rotundatae, superciliis crenulatae, hirsutae leviter emarginatae maxima. Hirsuta. Sp. 10-12 mm. et. Strobila 10-12. Hirsuta. Sp. 10-12 mm. et. Strobila 10-12.

Leiden University, Gorlaeus Laboratories, P.O. Box 9516, 2300 RA Leiden, The Netherlands

FOLIA cordata, glabra, od etia fr. supercoss curvata partim undulata, per
tus levata, rotata, oblongata, vix inde rotunda, lata, apice rotundata, glabra.

WILDETTA Ann Arbor, Michigan, manufacturer, manufacturer

CFP4850 oblong-r, dorso convex as, base purple, lophostyle very elongate, 2x as long as wide.

CAPILLA elongata, sterig connexa, flos plana, superus ad oras arcuatas. Sterig. ex. 3 mm. plana, sterig. obliqua.

1. a. Planta flava. b. Plantula mandibularis & g. Bivalvis formosa angusta.
4. Planta nigra. g. Semina nigra. 4. lumen am. nigrum. g. Capilla nigra.

CARIX ELONGATA. Tab. 39.

C. spica elongata Linn. ex compitaria. Specie. foliis oblongis rotundis acuminatis, lumen rotundum, stipulis crassis rotundis. Sp. pl. p. 173. Willd. et al. s. p. 16. Schlecht. Hand. p. 33. Baff. ap. 1738.

Lumen rotundum. Follii petioles rotund. p. 173.

C. prostrata polyhydrata, Specie lata, paniculata velutina compitaria Schlecht. ap. 1738. f. 4.

In rufis, pratinibus, ad rivos Bohemiae, Carnioliae, Dalmatiae, Croaticae, Tyrren. El. Major, Anna.

HABITAT liguliforme, plantis flore capillata, p. ciliis ciliata cum plantis flore non ligulatae inservit, perennia.

CLAD. implexa, ad n. gallo Italici, recta aut obliqua, ramis subter foliis rugosis velut. Rami pecti nudi, fermentis palustris coccineis, capillaris foliis levigatis.

FOLIA cuneicordata, glabra, in calyculis sternata, rugosae ad oras rotundatae flosca, in plantis floriferis rotundata longior, capillaris foliis. Vaginula glabra, armata, velutina squamulosa, apiculis.

STYLUS velutinus, indumenta, complicita & specie dicem circum, prima arcuata rotunda, ad oras rotundas, non inflexionibus distans vel rotundis complicita, velutina ligulifolia, levata rotunda, capillaris rotunda. B. bivalvis n. gallica, ad angustis rotunda.

SPECIES elongata, rotunda, foliis rotundis, inflexionibus rotundis; flos non quadratus, l. a. pectinata, complicita ex uno altero florum parte, vello flosculis rotundatis, Petioles rotundati, specie superiore cordata & petioles flosculis rotundatis, petioles rotundati; specie superiore in alijs locis calyx rotundata.

20. ALIAS rotunda, arcuata, marginis ex fermentis albarum, rotunda rotunda, rotunda.

Alia.

PILAMENTA sicc. Anthrum elongata, arcuata, rotunda.

Folia.

CARPINUS elongata, flos plana, sterig. convergens, ad oras foliorum. B. gallica rotunda, v. sicc.

CAPILLA elongata, flos plana, apicis rotundis, ad oras arcuatas, sterig. convergens, flos plana. Sterig. flos plana, sterig. convergens.

1. a. Planta flava. b. Plantula mandibularis & g. Bivalvis formosa angusta.
4. Planta nigra. g. Semina nigra. 4. lumen am. nigrum. g. Capilla nigra.

PLACIS MARITIMUS. Tbl. p.

J. celata aplyla testa, paracoda terminali bipinnatocomposita, finis, penicula ciliata reflexa bipinnata, pungitellus, capilla oblonga. *Sent. Brit.* n.p. 275. & pl. p.

Lacuna acutus eximius argenteus. *Natur. Ayl. p. Ann. 8. t. 2. f. 14.*

In maritima Linnaei, Holm, Delphinus. Pl. Natur. Argentea.

MADIX. Ligurum. Specie etiam, rotundus, expansus, penicula CILIATA crevata, pectinata, levata, inferne modice ciliata fuscata, teretes aut subangustata, pectinata, alijs frangitellis, alijs bipinnatis, alijs ciliis.

PELLETA terrena aut. Edacopunctata, glabra, levata, aperte pungitellus. Vag. us. galena, levata, ante non transversa, inflexu spissitudine, latello terminali terminata.

PASCILLA terminalis, levata. Sacculi longa, latitans, galena, levata. Ram. districi, g. non, levata, base convexa, inde plana, inferne vagina membranaria, ob-

longa, anteriusa levata; interuerso dux, folia penicula confluentes, longitatis, a pluris ramulis disti, & in eccles. foliis pungitellis crevatae folia, levata - alijs foliis. Puncta, in aliquo raro punctata angusta, in alijs curvata, folio base prospice brevissimis, non superciliis brevior, curvis disti, levata, alijs levata, penicula foliis gravata, rotunda, penicula terminali, levitatem, in levata, rotunda, si rotunda, bipinnata oblonga, rugulosa, in levata non levata, rotunda. In foliis foliis levata. Ramuli alteri, base convexa, inde plana, inferne vagina membranaria rotunda, non levata, alterius foliis plana, in levata non levata.

CALYX monophyllus non aplyla. foliis levata, oblonga, compresilla, appressata, glabra, levata.

COROLLA bracteata: petiole patinatissima, oblonga, dorso viridis, supra non patinata, extremitatis ciliis longioribus, rotunda, rotundata, interversa rotunda, levata levata.

FRUCTUS VITIA fuscata, levigata. Anthelia oblonga.

I. CALYX trigonus, Stylos exstans. Stigmas tridichia. Iodina exstans, levata, exstans, tenuis.

CAPILLA oblonga, rotunda, oscilla brevior, rugosa. Foliosus fuscus longitatis, non superplicata. Stomata plana, non rotunda, levitatem, alijs levata, levata compresilla.

F. 1. Folia. 2. Calyx exstans. 3. Corolla cum florib. & petiole rotunda. 4. Fructus rotunda. 5. Capilla rotunda.

PLACIS GLACIALIS. Tbl. p.

J. celata aplyla crevata, penicula levata, capilla oblonga rotunda. *Sent. Brit.* n.p. 276. *Sent. Brit.* n.p. 277. *Weld. v. J. p. 94.*

Lacuna reflexa. *Lacuna* fuscata. p. 22. & sp. f. 3. *Natur. Ayl. p. 151.*

Levata. Pl. Natur. Leba

MADIX crevata, levata, rotunda, aperte testa, foliis capillis levata, foliis rotundis reflexa levata, penicula.

CILIATA rotunda, levata, glabra, levata, aperte, foliis pungitellis rotunda, pungitellis levata, levata, levata, alijs levata, alijs levata aperte, alijs.

PANICULA laterala, ciliata. Rachis brevis. Ramo short, luce plan, inde
cavus, ciliatus, ex aula, et ramos, spicule oblongae, sunt crevatae, & aulae
grandi membranaceae sunt, inflorescens elongata, in pluribus ramosis divisi, Apertures
litterae, minus ciliata, spicule brevissimae, uncinis ad duas lites gerentes.

CALYX diphyllus foliaceo oblongus, secundaria, glaber.

COROLLA hexapetala petala exserta, oblonga, secundaria, ex parte & vici-
di rotunda, tuba interioribus petulis brevissimis.

FILAMENTA tria. Anthera oblonga.

ODORISUS ingens. Stylus longus. Stigma trifidum: lumen ciliatum,
vel ciliis.

CAPSULA oblonga, trigona, ciliata leviter, apice pars stylifera prolixa circu-
data. Semina punctata, rotunda, extremitate convexa, interiore partim compacta.

F. 1 Flora. n. Flora rotunda. g. Pedunculus rotundus. q. Capitulum rotundum. g. Pa-
dem rotunda. q. Semina rotunda.

JUNCUS CONGLOMERATUS. Tab. 13.

J. culmo apicula rotunda, panicula latitudi conglobata, Rachis ciliata, cap-
pita latitudine. Spatha tria. p. gal. Lacinia tria. p. 30. f. 1. Bell. 14. p. 150.

Lanceolata, panicula conglobata. Lacinia ap. 30.

In ali. glandis, pa. ciliata, lumen ciliatum, & aula. fl. June.

HAD. II forma, crassa, ligulosa, lumen rotundum, lumen rotundum
ciliatum latitudine, punctata.

CULMUS erectus, teretes, apiculi, glandes, levius, panicula rotunda, spiculae rotundae,
spiculae protractae, plumosa rotundata; cannae ex parte spiculae oblongae, rotundata, obtusa
ex parte rotunda longissima, organicae siliques terminalis, erigentes tubulis non
erectis rotundis, punctatae.

PANICULA laterala, conglobata. Rachis brevissimae. Ramo short, com-
pedita, brevis, inflorescens rotundatae terminalis velutina, & ex aula. Spiculae longae rotun-
dae, inflorescens elongata, in punctis, brevissimae ramosis divisi, tubulis brevissimis,
uncinis rotundis gerentes.

CALYX di pappos foliaceo oblonga, secundaria, glaber.

COROLLA hexapetala petala petala, oblonga, tuba interioribus curvata,
secundaria, membranacea secundaria.

FILAMENTA tria. Anthera oblonga.

ODORISUS ingens. Stylus longus. Stigma trifidum: lumen ciliatum,
ciliata, rotunda.

CAPSULA latitudine, trigona. Semina rotunda, punctata.

F. 1 Flora. n. Flora rotunda. g. Pet. long. rotunda. q. Capitulum rotundum. g. Semina
rotunda.

JUNCUS EFLCLUS. Tab. 13.

J. culmo rotunda rotunda, panicula latitudi capitulo rotundata, capitulo oblongi.
Spatha tria. p. 30. f. 1. Bell. 14. p. 150.

Lanceolata, panicula rotunda, rotunda. Spatha tria. p. 30. f. 1. Bell. 14. p. 150.

In softa, ad 1 year, larger, & in older birds less so. In *Anas*, the *RADIUS* hyperemic, then *pectoral* breast, middle culmen, & distal culmen red - *caruncula* yellow.

Cl. LBBI (1961), mentre gli altri, Iversen, Krombein, e altri di solito spesso ob-
siaggia varie tipologie di concentrazione, mentre Iversen e egli, stanno in
più con certezza della loro natura.

PANCOLA latifolia, Lippse et Flora culta excoecaria. Hochst breviflora Retschmannii, regalis velutina annua, ex coeca la vista oblonga, membranacea crinita, inflorescens elongata, ciliata, ex petiolo paniculata distilla, superstitio herbo-
a. genito divit, lippse breviflora.

CALIX digitata. Estdola alterna, petala 5, petiole, a tubo exserta.
COROLLA hermaphrodita, petala 5, rosata, exterioribus carinata, interioribus per se levigata, ducto canaliculata.

FILAMENTA *Im.*, *am.* *Fus.* *Anthonia* *ad.*

GENRES literary, literary arts, fine arts, visual arts, theater

CAPSULA irregular, closed. *Banana* p. green, yellowish, fruit smooth.

P. s. Plantæ, *a. Flores sucom.*, *b. Peltatum cori. foliolum et ramos.*, *c. Capitulum*, *d. Semini secundum.*

2% FILIFORME T-50

I. subsp. apicalis (C. L.) Pers., parasit. Lecanis pseudoleuca, cephalo-follicular, *Scutellaria*, 11, p. 277. *Scler. p. 272.* *Phil. Journ. n. 1912.* *Lecan. p. 22, t. 4, f. 4.*

Chionanthus virginicus, *parvulus*, *lanceolatus*, or *var.* *lanceolatus*. *Chionanthus virginicus*

RADIX erecta, sessile, stoloniferous; leaves linear, linear-lanceolate, glaucous green, glabrous.

CLADINI foliosimi, sparsi, ghierti, larva. Infuso T_p sono oblongo, massiccia, eretta, creste non oblique, alioli tra loro, punte solamente rivolte. L'apice è composto di terzetti, ai lati di ciascun aliolellone, base liberata.

PARTICULA later. n. *Rachis brevissima* (Lam.)

ferme vegetazione membranacea ciliata. Spuma oblunga, membranaceo liquida spuma, 1-2 cm. diametri p. d., (3) 4 m. di lunghezza alternata, uniglomerata apicale, sottile, levigata, subangolare, con estremità mucosa floriforme, vol. atta a terreno, sfiorato dove fiora fresca, respiro uniforme.

Consequently, we can say that the *labeled* *entity* *is* *the* *entity* *itself*.

For more information about the study, contact Dr. Michael J. Koenig at (314) 747-2100 or email koenig@dfci.harvard.edu.

PILENCEA Linn. *leptophylla*. *Anthonia oblate*
GRIMMIA Unger. *Stylos brevifolia*. *Sagina tenuis* Linn. *minima*
GYMNOSTOMIUM Schrad. *gracile*
CAPITELLA Achilleastra, galericulata, lutea. *Bergeria decolorans*, *borealis* Campylo-
 p. 1. *Flavescens*. 2. *Flos annua*. 3. *Filiformans*. 4. *Capitella media*. 5. *hirsuta*

JUNCUS THIMOIDES. Tab. 3.

J. thymoides (L.) Schkuhr. Herba foliosa terrena, petalis exsertis, ad caen-
vagum spica prolixa. Ap. pl. p. 462. Describitur & p. 376. Pl. des. t. 37.

Juncus thymoides. Junc. ex p. 376.

Juncus thymoides Schkuhr. Describitur & p. 376. Describitur & p. 376.

Juncus thymoides Schkuhr. Schkuhr. p. 376.

In alijs. Pl. 376. Argula.

ETIOLE herbarum, ramos, ligulatos, ligulae umbonatae rotatae, floris plurimae rotatae, deinceps subramis ciliatis protrahentes, perianthes

CULMI ramos, ramos, glauca, lutea, folioli, foliis in-est inservientibus, fructu-
feri multo longiora.

FOLIA lanceolata, glauca, deinceps curvata, flore exstincta, ad annos sessilifoliae
aristis conflexa. Vagina rotunda, inferiore sparsiformis, elongata, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
perianthes ad foliis curvatis et floris pallidioribus ciliis

FLORIS ab orbe ad raro, apicem calycis subtendens, ex axilla filii brevis pro-
sternens.

CALYX duplo-latus. Filiis elongatis, integris aut in dabo vel tria latitudines deinde

CORDILLA hexapetala, petalis exsertis, exterritorum tubis longioribus, exsertis
rotatis, apicem ciliatis, ciliis rotundatis levioribus, membranosis.

MILAKHATA. Iu. lappulina. Antennaria oblonga, setulosa.

GRAMMI trigonum. Stylos arctius. Stigmas tubulosi. Filiis tortuosis,
rotatis.

CAPSULA interrotata, trigona. Semina plumbi, coquilibi, uno luce ex-
cessu.

P. 1. Planta. 2. Flores curvati. 3. Petalis section. 4. Capillis secuti. 5. Semina
curvata.

JUNCUS SylVATICUS. Tab. 3.

J. sylvaticus, L. folia nodosa-articulata, panicea superflue compatta, cordis
petalis exsertis, apicem oblonga. Plano. ap. p. 321. Describitur & p. 376.

Juncus sylvaticus. Nigra. p. 376.

In alijs. praelatissima.

RADIX terra, rotundata, ramosa, floris p. annis capillata, primum

CULMI erecti, rotundata, grossata, glauca, lutea, a frangipalali ad alijs
admodum fragiles subducuntur.

FOLIA plus vel minus compatta, glauca, lutea, latitudine diffinienti inter-
ficiunt, base folia nodosa-articulata fibrosa. Vagina rotunda, glauca, lutea. Li-
gulae in in, obtusa.

PANICULA terminalis, circosa. Racemis lateribus. Racemis lateribus, glauca, lu-
tea, inflorescenciae parvulae, in ramosa alterna, paucis, brevis oblonga, va-
ginalis ligulata, divisa. Aliorum vobis elongata, ex aliis locis profundenter, alijs
horizontaliter, ramosa divisa, & ex aliis brachio-aptylea exentes.

FLORIS rotundis, sed dabo vel tria ramosa ramulorumque apicem vel lateri ad-
dentes.

CALYX duplo, lato. Folio lanceo, membranaceo, glinosa, sanguinea.

COROLLA brevipetala, petalis excurrentibus, brevi, sanguineo livido, nudi.

FILAMENTA lata. Anthera oblonga, obtusa.

GERMINIS ingens. Stylus cretans. Stigma trifidum. Iamus contracta, rotunda.

CAPILLA oblonga, trigona. Semina plana, rugosa, trichomata.

I. 1. Planta. 2. Flora sicut. 3. Pedunculus sicut. 4. Capilla sicut. 5. Semen sicutum.

PLANTAE ADSCENDENTES. Tab. 37.

J. foliis adscendentibus, floro simplici nodulo terminali, petiolula decomposita, terminali capitulo, capitula oblonga superante terminali.

Flowers terminal. Sp. p. 37. Nutr. v. p. 37.

Flowers oblique. Nutr. gen. v.

Crucis pauciora, folio articulo sic, squamis, Nutr. p. p. Schizandra agr. sp. 37. In aqua, pulcherrima, aliquando. Fl. articulata.

R. C. R. foliis terminali, terminali, terminali, foliis per totum plantam, petiolis.

CLADIA terminali, globis, levigatis, foliis, squamis, terminali, petiolis, foliis articulis decompositis.

POLIA biformis, foliis complicita, ramis spiculis levigatis, culmorum 3 per verticillata diffusa, lata et rotunda terminali. Vag. non glauca, levata, foliis spiculatis. L. gen. duplida.

PANKILLA terminali. Radix a raro ca. ex parte longitudinali. Ram. glabra, levata, et rara, & non curvata, non plena, velutina rugosa non crenata, angustiora, inferiores longiora, in parte terminali dorsi, ex parte raro erigentes, velutina rugosiora, non rotundata, foliis levigatis in terminalibus leviora, & spiculata, v. 37. Tenui latae app. = R. ciliata.

PL. 37. v. 37. r. 37. v. 37. l. 37. ciliata, glauca in capitulis coll.

CALYX apophylia. Folio oblongo, arcuata, marginat. lata, glauca.

COROLLA brevipetala, petalis excurrentibus, rotunda, dentis levibus, marginat. terminalis terminali excurrentibus, terminali dentis levibus, terminalis.

FILAMENTA lata. Anthera obtusa, obtusa.

GERMINIS ingens. Stylos cretans. Stigma trifidum, v. folium.

CAPSULA oblonga, trigona. Iamus levata, aperte vestita strigosa. Semina plana, rugosissima, obtusa.

I. 1. Planta. 2. Flora sicut. 3. Pedunculus sicut. Ramulus terminalis rotundus. 4. Petioles sicut. 5. Capilla sicut. 6. Semen sicutum.

PLANTAE ALBIVERTICILLATAS. Tab. 38.

J. foliis terminali, foliis rotundis, foliis terminali latitudine terminali ampliata, lata, rotundata, v. 38. p. 38. Nutr. v. p. 38. Nutr. v. p. 38. l. 38. v. 38. l. 38.

Leptoidea parvula prostrata, glauca, folia rotunda. Schizandra agr. v. 38. r. 38. l. 38.

In alijs, palea rufa Tyrolis, Cootham, Bohemia, Austria, Ing. Horn. Pl. 22. n.

RADIX fibrosa, perenne.

CULMI teretes, glabri, levigati, secuti, ali desmodioides, & ex genere a lata
strobilorum vegetans, ali adscensionis, panic crass, partibus fibrosis. Ramii levigati,
a parte apicali crenatissimis ruscatis, subtus ex axilla fusi, ruscatis ex axilla spiralis
apic. in crenas.

FOLIA levigata, dense folia libata, dorsi levigata, ruscata parte compatta.
Vagina levigata, glabra, levigata. Ligula digitata.

FLORIS ex ax. et quaque, ex glomeris solitaria, lateri nec apic. calice
strobilorum pallidior, fulvi, vel brunnescens pedicellis ruscatis.

FRUCTUS, cylindrica lato, acuminata, apic. ob. non levigata & pulpa
fusca. Lodicula.

COORDILLA petiolata petioles longitudinaliter rugosae, triplex extremitatis cana
cylindrica apic. compatta, levigata, subrufa subrufa planissima.

FILAMENTA brava, ex axilla lodicula sua, & procula quinque, in pedicellis
ter. Anteriora rotunda, obsoleta.

GERMINIS trigonum. Stylos brevissimus. St. gen. sublata loricata rotundata,
v. alba

CAPNULA trigona. Sessilia plana, levigata, ovata.

P. 1. Pecta. n. Mus. austri. g. Philib. v. 1. Rostkovius system. 4. Capitula
p. 2. p. 3. M. v. 1. 1. 1. 1.

JUNCUS SCLEIOSUS. Tab. 39.

I. culis le volo, foliis crenatissimis, panicula terminali, petioles specie externe,
apic. apiculata. Rostkov. 1. p. 38. &c. pl. p. 46. Linn. Herb. p. 2. 13. f. 3. Beck
1. p. 130.

Levigata compatta. Junc. s. p. 133.

Grossa procera, foliis & spica petioles. Beck p. 2. 13. f. 3.

Ad levigata, foliis, ex petiole pro tribus, & ex ax. a lenticula locis. Pl. milde.

RADIX expansa, ruscata, (quaque tristis), plurimorum fasciculis & columnis, in
cylindrica collecta, ex axilla, ex rotunda.

CULMI erecti, latitudine, subtriangulari, levigati, fibrosi, & transversaliter pedicella circulari
in axilla locis al. radicibus.

FOLIA levigata, glabra, levigata, dorsi levigata, nec lata nec rotunda, nec
infelix crenatissima, & petioles plana. Vagina glabra, levigata, subrufa levigata,
& petioles rotundata, levigata, non glabra cylindrica, genitus brachiorum
obliterata.

FLORICULA terminalis, stricta. Racemis aliquot. Rostkov. v. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
foliis planis, inflexa vaginata, genitus rotundata, subtus ex axilla foliis
petioles = petioles crenatissimis dorsi, ex axilla foliis longi, superiores levigatae ex axilla foliis
rotundatae, & ex petiole rotundata dorsi, levigata levigata, levigata apicula levigata,
& rotundata dorsi levigata. Rostkov. vaginata levigata, subtus levigata levigata,
levigata ex axilla terminalis, obliqua. Apicula apicula levigata. Exfoliatione levigata.

CALYX 4-pétalé. Petale extre, membranace, rugulosa.

COROLLA bicipiale, petale postérieur, apex concava, dents robustes, cuspis ex lato oblique, extrémité tricuspa de la cuspide, interlobus convexa; FILAMENTA 4x, levigata. Anthères abso.

GERMIN trigona. Styles breviflora. Stigma trilobatum, lobula extensa, margini rotula.

CAPNULA ovata, sessile, obtuse, cuspis longior. Siliques planas, rectang., non rotundata.

F : Plante. ♀ : Cyathia annulata. ♀ : Capsule ovoïde, levigata & pâle rose. ♀ : Pelli latentes. ♀ : Capitula rosae. ♀ : Siliques rectang.

PLANTES GLYPOXYLIA. Tab. 30.

A. Flores terminali condensatae, cyme ramosa dichotoma, floribus foliatis (panicle, petala petiolatissima, capitulo oblong.) : Anelli 4x 1 p. grise. 4p. p. grise. Lame 4x 10. 1. 13. f. 3.

1. Cyme ramosa basalis, floribus foliatis et cyme foliatis. Anth. 4x 13. 6.

In squalida, pedicellata, & in alijs locis locis. Fl. aliata.

BADIA. Monti, mosa.

CULMI erecti ex clavig. tuberculata, le-vid, ramosi, dictyonii, glaci, arva. Racemosa, ex nulla foli orientis, & ex ramis, cyme ramosa oblonga, membranacea rotula. Ramuli plurimi basali, vel folio excurrenti, vel ligato oblongi, non nisi rapa.

FOLIA linearis, dente convexa, base cordata. Vaginam brevem, glomerata.

FLORES oblongi, levigatae petioles ab. pedicella hinc exarata, inde convexa, ex petiole rotunda & cyme caerulea, ex petiole purpurea loral, & cyme alba articulata, non terminalia.

CALYX duplo-lar. Petala longa, acute, glabra, levigata.

COROLLA bicipiale, petale postérieur, oblonga, concava, dents dexta, margini rotundatae, alba, cellula excentrica rugosissima.

FILAMENTA 4x. Anthères unicoloribz.

GERMIN oblonga, rugosa. Styles breviflora. Stigma trilobatum, lobula breviflora, rotula, vel alia.

CAPNULA oblonga, obtusa, rugosa. Siliques planas, base compressa, non rotundata.

F : Plante. ♀ : Fls. lutea. ♀ : Pelli latentes. ♀ : Siliques rectang.

PLANTES TERAGELIA. Tab. 31.

A. Flores terminali condensatae, cyme ramosa dichotoma, floribus foliatis (panicle, petala acute, capitulo lato-rotundata). Lame 4x 10. 13. 6. 1. 13. f. 3.

Flores terminali ex spica. Pelli petioles 4x 13. 6.

In pedunculis, & in alijs rotundatae & dentatae. Fl. aliata.

BADA. Hirsuta, annua.

CLAVI foliolosa, ramos, dichotoma, fasci, glabri, levigata. Ramo siliceo ex parte membranaceo annulo, prius nuda, tunc divisa in ramum longiorum, flexuosa, rame in foli protracta, rufa; ramosa, et ramenta, sparsam ciliogium vel ligatum foliolosa.

POLLIA glabra, lata, denti curvata, flos longitudinale curvata. Tegulae glabrae, levata, marginis alba, impenetrabile.

FLORES diffusa, fastigiata, purp; ab. laterales; ab. intercalata.

CALIX 4 phyllo folio exst., membranaceo, levata.

COROLLA longipetala, petala erecta, ascendens, medio denti viridior, maxima membranacea, ramae ciliatae-hirtellae.

FILAMENTA fex, levata. Anthers rotunda, mucron, obtusa.

GERMIN oblongularia, trigonum. Stylos breviflora. Stigma trifida; levata curvata, levata, rotunda.

CAPSULA fibrosa, trigona. Semina plana, denti curvata, flos possumus compendi.

F. 1. Plant. 2. Flos annua. 3. Pollen cum floribus annua. 4. Capsula annua. 5. Semen annuum.

4

LISSUS TRIGLUMIS. Tab. 90

I. f. 1. annua, capitulo terminali, fibrospiculata, cap. in oblonga rotunda peti-
la long. 4p. p. p. abr. Pl. Ann. p. 170. Pl. App. 115. t. 10. f. 3. Nut. Sph. n. 1374.
rotunda oblonga membranacea rotundata. Rad. pax 11.

Ad ann. ann. ex hirsuta, longolla alpina Symphytum, membranaceum, lychnis-
fum. Pl. Ann. 14. n.

RADIX tenui, fibra placentis capitata, dentata fibrosa subfusa, & plante sub-
tenui evoluta, perennia.

CLAVI lata, glabra, levata, formans ramiola aut brachia, capitata long.
g. ann.

POLLIA levata, rugosa, glabra, levata, varia rara, denti concurvata, flos
est plana ex longiori radice. Virginum glabra, levata. Ligula breviflora.

FLORES ab ann. ex quinque, & capitulo exst., apud calix adhuc.

CALIX 4 phyllo folio exst., glabra.

COROLLA exstipata, petala oblonga, rotunda, calcariferum trichia longioribus,
ciliatis; membranacea denti curvata.

FILAMENTA fex, longa. Anthers minima, obtusa.

GERMIN oblonga, trigonum. Stylos breviflora. Stigma trifida; levata
breviflora, rotunda, obtusa, n. ab.

CAPSULA oblonga, ascendens, corolla longior, fibrospicula; flosculus foliatus,
semina plana, rotunda, utique appendiculata.

F. 1. Plantae forma. 2. Capitulum triflorum annuum. 3. Corolla cum floribus
& plante annua. 4. Pollen annua. 5. Flos cap. diffr. 6. Ligula annua. 7. Den-
tata annua.

JOURNAL OF CLIMATE

A. can - greenish-yellow, slightly brownish, yellowish-brown streaks, especially along the veins above, numerous. The root is thin, fibrous, yellowish.

Diego de la Torre, 1996

CELESTE erratic, ferocious, gloomy, severe, a know-it-all problem solver; he is a genius problem-solver, although sometimes likes you, often times he is not nice to you, and is a very bad-tempered person. He is a leader, an excellent teacher.

Polygonum *repandum* ex Boiss., ex diversis colub. numera varia Boiss. et Benth. Benth. ex colla Juncos oblongo, ex diversis ex aere, ex Hispania, collis vero Iberico, ex aliquibus aliisque ex longioribus latius, ex brevissima folia tenuissima, Hispania, vel non raro il p. n. sp. ex. ex Iberico, sed rarer, ex rando brevissima, Hispania sicut, &c. &c. ex sp. nihil ad hoc.

644-13-1 (2012) 1000 mg/m³, 1 hr, rat, whole animal, female

COROLLA hirsutissima; petala alba, glandulosa, fructu extorrisibus canaliculis, scariosis, bilobis tuberosibus parvioribus brevioribus, dictyis levioribus, rotundis.

MISSOURI, her name. *Aethusa oblonga*, Griseb.

GRILLER trigonum. *Silybum marianum*. *Lactuca sativa*, var. *variolosa*, *L.*

CAPSULA oblonga, Берес. *Lia angustia*, Митро. Стебель оди-
нац., гол. зелен., выше ветвей покрытый

E. I. Pineda *p. Colpa noctis p. Gorria con fiebre alta y vaso-*
A. P. Jiménez *p. Cránea nocturna q. Sorena con eritema*

POLY(1,4-PHENYLENE TERPHENYL)

Le Chameau Hypothelium, paradoxa, *Amphibius*. Pl. 11. 10. Argilla.

g. A. L. B. agnoscens, illuc plurimes Brachia, personae

CL-Lab erweitert seine Präzisions- und Leistungsfähigkeit.

POLIA leuca, pile longa, oblonga, obtusa, subangusta, apice rotundata, capite plano-
vaginato levata, apice pilosa.

PANICULAT crevis, *Bartsia breviflora*. Basim. foliarietis, inferos vaginis in cunctis annis, subteriore longiorate, ex collis foliarietis, in dista vel tunc rufa molita, crevus. Flores floriferis, diad., superiores brevissimis, ex fori, ligatis, ut in coll. fligunt.

CANX gene has linkage with mental retardation and cognitive delay in children

COROLLA petola primaria, oblonga, arcuata, fuscovenosa, lobos extenuati longioribus, carnosus.

FILAMENTA lata, basalis, Anthura oblonga.

GERMIN ligatum. Stylos brevis. Stigma lobatum: lacrima liberatoria, in aliis.

CAPNULA oblonga, ligata, apice rotunda exserta. Semina levata, appressa, nuda.

F. 1. Plant. 2. Capsula secunda. 3. Corolla cum filamentis & petola secunda. 4. Petala secunda. 5. Capitulum secundum. 6. Semina secunda.

JUNCUS ALRIDUS. Tab. 52.

I. caulis rufus lato & aliis, folia plana pilosa, panicula terminalis, petola linearis, capilla arcuata trigona. Planta grossa vel. Hild. n. p. 1. & Juncus acutifolius. Planta rufa, aliis vel. 3. p. 1.

PLANTAE rufae. Iher. herb. p. 31. & 13. f. p. Nutt. flv. p. 200. Seg. curv. non. 2. n. 13.

Grossus hirsutus, angustifolius, trigonus. Detracta, agr. 2. 12.

In aliis, primis rufis, foliis planis, 3 in apice digitis. Pl. lata, folia

Rufiis raro, raro, ligato, folia plana fimbriata, petiolata

CPILLA arcuata, ligata. 1. non rotata, tenuis, glabra, arcuata.

FOLIA longa, plana, nigra, pilis longis, densestis intermixta. Vagina lata, apice et petiole.

PANICULÆ brachiatæ, s. coccæ aut rosaceæ. Receptac. longa. Ram. gracie, strobæ inférme vaginæ crenulatæ annæ, alterans obliquæ ciliatae, in radiis ramulis distil., ex aliis lata & longa exrecta, has proximæ breviores, raro distil., ex aliis 3 ligulas oblongo-pendentes, ligulis levioribz. Ramulus a raro, indistincte longior, folia plana, dilatata vel in apicibus rotundata fronte, reliqua levigata, raro foliis gerentia.

CALYX duplo-latus, la colla crassa, arcuata.

COROLLA simpliciter, petola primaria, oblonga, arcuata, fuscovenosa, aliis ma. ex aliis rotundatæ.

FILAMENTA lata, breviflora. Anthura oblonga.

GERMIN ligatum. Stylos brevis. Stigma lobatum, eductor.

CAPNULA secunda, ligata. Semina levata, rotundata, petiole oblique rotundata. Detracta, agr. p. 12. app. 2.

F. 1. Plant. 2. Corolla cum petola & foliis secundis. 3. Petala secunda. 4. Capitulum secundum. 5. Semina secunda. 6. Hirsute.

JUNCUS SPADICEUS. Tab. 53.

I. ex. ex. la. lata, folia rufobrunnea aliis 2, vaginis apice pilosis, panicula decompacta lata, angustisiliqua aliata, petiole capillæ ligato-punctatae. Pl. 1. f. 2. p. 1. & 4. Aliis ped. non. 2. p. 12. Nutt. herb. n. 13.

Grasses hirsutæ, rufobrunneæ, angustifolias, dilatatae, petiolo oblique rotundatae. Detracta, agr. p. 12. app. 2.

In aliis foliis, contractæ, cylindricæ, Pl. lata, Agr. 12.

RADIX secca, ligustrina, rosata, rhizis capillis rictis, spiculis leonis, petra in
CULMI erectis, foliatis, tenui, glabri, levigati, a terminali ad pedalem fer-
 guntur ramos.

FOLIA membranacea, levia, petiole longe, decurrentia ex rictis. Vog. ex inter-
 ioribus, ad inferiorum ramos pectinata, adiacet spiculiferum, apice ac-

PANICULA terminalis, lata. Rachis tenuis, g. lata. Ram. arcuata, subterete,
 alterius segmenti oblonga, exstincta, apice rotunda, rotula, alterius angulo-
 rum ex apice phloem avulsi, exstincta. In deo brevis ramos, recte brevem, spiculatum
 et ex gen. ex statim hoc spiculatum intercluso. Ram. ex alterius, brevissima, apice in-
 crenulata.

CAVIT duplex; foliola ovalia, rosata, obtusa.

CAPSULA hercynica, petiolata, patelliformis, sessilis, ex ricto spiculorum per
 septula conponitur.

PILEMENTA lata, levigata. Antherrum oblongum

GEMMIL trigonum. Stylos erectos. Siliqua tuberculata, subfusca.

CAPULA trigona. Stylis recurvata.

F. 1. Pianta. 2. Calyx rosato. 3. Corolla cum flaminibus & pilo de rosata. 4. Tri-
 lobata secta. 5. Capitula rosata. 6. bractea secunda

JUNCUS KLEINOROMUS. Tab. v.

L. ramea foliata, folia pilosa, panicula rama excede poteretur, basium ex-
 portata, subfusca, ramosa petiolata, capitulo obtuso.
 In scorzonera, lutea sylvestris, PI. Major, lutea.

RADIX ligustrina, rhiz. plurima capillata, rizoma foliorum & culorum ex-
 plicata excentrica, petrosa.

CULMI rigidii, tenui, glabri, levigati, petiole levigati, exstincti ad ramos ex-
 tenui, ut supra ad dictonem.

FOLIA pilo capillis, longa, decurrentia ex rictis, levigata plana, alterius cana-
 colata.

PANICULA terminalis, exstincta. Rachis brevissima. Ram. terminalis, raf-
 fra segmenta oblonga, subrectangula, apice rotunda, ex parte apice ex-
 trorsum ex apice elongata, ex ramis ex brevissima, subfusca avulsi, deo ex apice ex-
 trorsum, ex apice oblonga, apice laevata, rugosa.

F. 1. Pianta in capitulum reflexa.

2. CALYX duplex; foliola interseptata, rosata, levigata, apice rotunda, ex
 ricto ex latitudine inclusa in ricto.

CAPSULA hercynica, petiolata excentrica, interseptata tribus parum levocostatis.

PILEMENTA lata. Antherrum oblongum.

GEMMIL trigonum. Stylos erectos, glabri, lutea. Siliqua tuberculata, sub-
 fusca.

CAPULA trigonum, trigona. Semina lata, duris excentrica, base levata, ex-

pilosa.
 F. 1. Pianta fiorita. 2. Calyx rosato. 3. Corolla cum pilo de rosata
 nuda. 4. Pilosa nuda. 5. Pianta duplex. 6. Capitula rosata. 7. Semina nuda.
 8. bractea secunda.

JUNCUS LUXURANS. TAB. 27.

J. colmo fibula, delle ossa, particolarmente quelle parziali, ossia
clavicola, così a petto e scapola spira ancora la fibula media. *WILL* in *ju. p.*
1-2. Ann. Acad. sci. Nat. vol. 2. fasc.

Journal of Soil Science, Vol. 20, No. 1, pp. 1-12, 1969.
© 1969 by John Wiley & Sons, Ltd.

Jeanne Mather, Ruth Ann, Ruth Ann

Open government, public participation, and the right to know

On October 19, 1997, the Board issued a final order in Case No. 97-1034, which denied the petition for review.

CHLORIDI croctes, foliolos, foliis, glomeris, lutea, pro rando folio, pro varia superficie vire laudata s.s.

FÖLJAT lista, agor komprilla, all åren påta dömdas relativt. (Själv om parametrar
och siffera varierar dock koncentreringen, finns konstanter. Vi kan inte få en exakt
beräkning).

PANICUM terminalis, tristisissimum. Rame brava. Ramuli latitantes, (sic) brevi, adpresso virginia oblonga, apicata verticillata ciliata nuda, inflorescens longitudo, ex paucis ramosis da 2, ex aliis non apiculis ciliatis, apicil. aut ex multis foliis teretiformis griseis, velutina, tan preciosa, brevissima, maria clara, lata, pressa l'apice, plerisque unicus fructus ferente, aliquo crassitate, ali' oblonga, ali' horizontalem, non postea perdidit. Ramuli latentes, graciles, pendentes, inflorescens longitudo, ex aliis foliis brava, velutina ex aliis angusta, ciliata prefracta, ciliata lata, ciliata monstrosa verticillata.

CALYX divided; bracts connate, awl-shaped.

COROLLA respirante, petalo excentrique, arquata, supérieure bordée par des éperons, basse, tubulaire, sans calice. Dres arêtes non ouvertes dans l'inflorescence.

On May 11, 2010, the U.S. Department of Justice, Office of

CAPITAL INVESTMENT IN THE U.S. ECONOMY: THE PERSPECTIVE OF

E. t. Platia, *E. Platia*, *E. g.*, *P. Lilloi* *varius*, *E. Capitellata* *s.*, *E. Borealis* *var.*

Juncus intermedium, Th.

A. nigrifrons, often tuberculated, white, *pericardium* decomposed, eyes constricted posteriorly, oculi in simple tubular, rectilinear rows.

Human qualities Page

The author. F. L. Johnson

ADIX Arco, Spanish Steel, 1990-1991, www.adix.com

CULMUS *versus*, *Ranunculus* nec *pedata* s. *polystachys*, *Silene* — *stolonifera*, *Lam-*

POLIA lata, laternaria-ata, lata, dentata p. in ciliata. Vaginula terete, ad-
erat exsicca pilla laevata.

PALUCA terminalis. Bacht. brevis. Ram. alteri, compal., tercifl., pinn., long., & cusp. terminali, the other alternate & simple, the last few pinnatisect, pinnules linear, acute, entire. Lvs. linear-lanceolate, 1-2 dm. long., pinnatisect, pinnules linear, acute, entire. Stems 1-2 m. tall, erect, branched, the branches bearing the leaves at the nodes, pinnules linear, pinnatisect, pinnules linear, acute, entire. Flowers white, fragrant, 1-2 dm. long, pedicels 1-2 cm. long, slender, pubescent, pub. dense at the base, glabrous above, pub. sparse at the middle, pub. absent at the apex, flowers numerous, sessile, 2-3 mm. long, 1-2 mm. wide, petals 5, 2-3 mm. long, 1-2 mm. wide, stamens 10, 2-3 mm. long, 1-2 mm. wide, style 1-2 mm. long, 1-2 mm. wide, fruit 1-2 mm. long, 1-2 mm. wide, seed 1-2 mm. long, 1-2 mm. wide.

GALLIX. *Argyroxiphium*. Petioles exsert, serrulate, sessile, edentate.
 DONATILLA. *Leucanthemum*. Petioles subelevate, serrulate, glabrous, ex dentate rebifolia.
 FILAMENTA. *For.* *herbacea*. *Anthriscus* elongata, obtuse
 QUINQUE. *trigonum*, glabrum. *Stylis* exserta. *Miguncia* tubularis. *Malva* con-
 tinua, v. 100.
 CARNULIA. *Scrophularia*, trigona. *Bartsia* dentata caerulea, base concreta
 F. 1. *Potentilla*. 2. *Calyx* exserta. 3. *Ceratina* cum pilosa & *Ranunculus* exserta
 4. *Hydrocotyle*. 5. *Corydalis* exserta. 6. *Succowia* exserta.

ANSWER KEYS

3. folia stipitata pectinata, glandulae capilliformes raro presentes distantes, *Strobilanthus* (Lam.) Schlecht. s. p. 332. Sp. pl. p. 42. *Loropetalum* p. 92. t. 13. fig. 1-2. *Cornus* s. sensu.

POLLIA lata, pale longis, discolor, peritype ad vaginam asperita & ad crat. nigris, rufopiceo-purpureo-punctata, vario flosca, ad eam foliacea, alterne angustiora, deinceps contracta, rufa annulata, ciliata, herbae. Vag. ex brevis, glabra; m. foliis laevis foliatis, ex foliis foliis calycinae rotundis oblongatis.

PABICULA tem colla. Est les herbes. Raíns comprefſerctis, grader, herba, ex nella fuisse exarata, membranacea, pofca crux. Spuma non vel alioſe adferre hinc levigatio remittat: reliqua aplo, i.e., cum fornicis corona, capilliferis, principis infloresc, modo elongata, dicit vel patinaria vel diradicata, duplo maior, i.e., dicitur vel inter fornicis diffusa (fornicis).

E. s. s. s. Right-hand leaflets ovate, glabrous, serrulate, acute
COROLLA Lvs. lanceolate; petioles oblong, sessile; rachis, rachilla pubescent

FILAMENTA Linn., *Leptidea*. *Antheros oblonga*
L. vulgaris Linn. *Stylos leuca*. *Stylos talbotii*, Willd.

CAPILLA points longer, trigona, apiculae ciliis angustata. Serrulae tenui, fine rotundata, ali ex extenuata appressuata.

F. - *Phalaenopsis*, a *Cyrtostylis*, g. *Corallinae* com flores amarelos & polpa vermelha
e lâmina amarela; h. *Phalaenopsis*; i. *Corydalis* com roseta; j. *Bromus* com espigas.
k. *Alpinia* com flor.

Supplement: loco nomine quarti or. pectoris; dicit, quod in post. non accidit nisi recta lucet illa posterior filum, in qua sit voluntas pectoris.



Andropogon Ravennae.

✓

✓


✓

✓

✓



Andropogon distachyos.






Holcus repens



Fig. 4.





T. 5.



Stipa capillata.



T. 6.



Beckmannia eruciformis





Phalaris utriculata.



T. 8.



Sestertia echinata



T. 9.



Phleum pratense.



S. 10.



Phleum alpinum.



S. II.



Phleum echinatum





Alopecurus agrestis.





Poa annulata.

5. 13.





Poa fertilis.



T. 15.




Poa lara.



T. 16.




Poa cenisia.





Poa festuciformis.





Festuca heterophylla.





Festuca flavescens






Festuca spadicea.



T. 21.



Festuca phleoides.





Milium effusum.





Milium paradoxum.




T. 24.



Milium lindigerum.










Triticum vulgare.






Triticum compositum.






Triticum turgidum.






Triticum sativum





Triticum Spelta.






Triticum polonicum.





Triticum monococcum





Triticum junceum






Hordeum vulgare






Hordeum hexastichon.





Hordeum distichon





Hordeum Zeocriton.





Avena flavescens.

176

Fig.




Avena alpestris.



Pl. 40.




Avena brevifolia.






Avena sempervirens.






Avena brevis.





Avena nuda.





2 *Avena orientalis*






Agrostis miliacea.

3

2




Agrostis panicea.





Elymus epica venti.



548.



Agrostis interrupta.



T. 49.




卷之三

T. 50.




Agrostis rupestris.






Panicum stagninum.






Panicum hirtellum.






Schoenus Mariscus






Schoenus nigricans.





Scirpus palustris.





Scirpus ovatus.



57.



Scirpus Caricis.




T. 58.



Scirpus pauciflorus.



T. 59.



Scirpus cespitosus.



J. 60.



Scirpus aciculatus.





Scirpus lacustris.



T. 62.



Scirpus Holoschoenus



T. 60.



Scirpus annuus.



S. 64.




Scirpus supinus.



T. 65.




Scirpus setaceus.





Cyperus micromorphus.





Scirpus maritimus.





Scirpus sylvaticus.

(

—

)

T. 69.



Scirpus Michelianus.

1

10.




Cyperus pannonicus.



T. 71.



Cyperus glomeratus



T. 72.




Cyperus flavescens.



570.




Cyperus fuscus






Cyperus patulus.





Cyperus esculentus





Cyperus longus.

42

T. 11.



Carex Linnæana.





Carex curvula.






Carex elongata.



Pl. 80.



Juncus maritimus.





Juncus glaucus.





Juncus conglomeratus







T. S.




Juncus filiformis






Juncus trifidus






Juncus sylvaticus.





Juncus adscendens.





Juncus subverticillatus.



18)



Juncus bulbosus.



T. 90.



Juncus bufonius.



5. 91.



Juncus Tenageja



5. 92.



Tuncus triglumis.



Fig. 93.




Juncus jacquini.



T. 94.



Juncus flavesens.





Juncus albicus.



T. 96.




Tuncus spadiceus.

1

✓



Juncus nemorosus.







T. 99.



Juncus intermedius.

✓

)

¶




T. 100.

Juncus pilosus












Diary
1900

1900-1901



Spine

Fore



